

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Varisalia granule

Croton tiglium 9 CH, Mezereum 15 CH, Rhus toxicodendron 15 CH

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 8 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Varisalia a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Varisalia podávat
3. Jak se přípravek Varisalia podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Varisalia uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VARISALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Varisalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě příznaků provázejících plané neštovice – svědění pokožky a puchýřků.

Přípravek Varisalia je určen pro děti od 1 roku, dospívající a dospělé.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VARISALIA PODÁVAT

Neužívejte přípravek Varisalia

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Varisalia se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Diagnóza planých neštovic musí být lékařsky potvrzena, proto si před zahájením léčby ověřte u svého lékaře, že se skutečně jedná o plané neštovice.

Pokud jste pacient se závažnou imunitní nedostatečností (HIV, leukemie (zhoubné onemocnění krve) nebo lymfom (zhoubné onemocnění mízních uzlin), probíhající chemoterapie nebo léčba steroidy), konzultujte léčbu jakékoli infekce s lékařem.

V následujících případech neprodleně kontaktujte lékaře:

- puchýřky se plní krví, prohlubují se a objeví se vysoká horečka
- puchýřky se naplní hnisem a prohloubí se
- v případě vysoké horečky, poruchy rovnováhy, zmatenosti, kašle
- v případě chronického kožního onemocnění (např. ekzému)
- v případě změn v chování dítěte
- v případě, že jste těhotná

Další léčivé přípravky a Varisalia

Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Přípravek Varisalia lze užívat během těhotenství a v období kojení. Neštovice však mohou matku a dítě vystavit významným rizikům, která mohou vyžadovat specifickou lékařskou péči.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Varisalia nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Varisalia obsahuje sacharózu a laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jedna granule obsahuje 42,5 mg sacharózy a 7,5 mg laktózy, což odpovídá 212,5 mg sacharózy a 37,5 mg laktózy v jedné dávce (5 granulí).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VARISALIA PODÁVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Sublingvální podání (pod jazyk).

Tento homeopatický léčivý přípravek se má užívat nejlépe mimo dobu jídla.

Doporučené dávkování přípravku je:

Děti od 1 roku, dospívající a dospělí po potvrzení diagnózy lékařem:

Pět granulí nechte rozpustit pod jazykem 3 až 5krát denně. Intervaly mezi dávkami prodlužujte v závislosti na zlepšení. Jakmile příznaky vymizí, ukončete užívání přípravku.

Dětem mladším 6 let granule před podáním rozpusťte, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, kvůli riziku vdechnutí granulí.

Délka léčby nemá přesáhnout 8 dní.

Pokud se nebudete cítit lépe po 8 dnech, nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Návod k zacházení s tubou:

Obráťte tubu dnem vzhůru a otáčejte víčkem tak dlouho, až Vám do něj vypadne příslušný počet granulí. Sejměte víčko z tuby a granule nasype do úst pod jazyk.



Jestliže jste užil(a) více přípravku Varisalia, než jste měl(a)

Při předávkování se neočekává žádné zvláštní riziko. Pokud se necítíte dobře, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek Varisalia

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48

100 00 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK VARISALIA UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Varisalia obsahuje

Léčivými látkami v jedné tubě (4 g granulí) jsou:

Croton tiglium 9 CH 11,81 mg.

Mezereum 15 CH 11,81 mg.

Rhus toxicodendron 15 CH 11,81 mg.

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak přípravek Varisalia vypadá a co obsahuje toto balení

Granule (bílé nebo téměř bílé kuličky) ve válcovité tubě s víčkem, 3 tuby, jedna obsahuje 4 g granulí, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., e-mail: info@boiron.cz

Zkratky uvedené na balení: LOT = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 5. 2026