

Příbalová informace: informace pro pacienta

ASPIRIN C Forte 800 mg/480 mg šumivé tablety

kyselina acetylsalicylová/kyselina askorbová

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů (při horečce) nebo do 3-4 dnů (při bolesti) nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Aspirin C Forte a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aspirin C Forte užívat
3. Jak se přípravek Aspirin C Forte užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Aspirin C Forte uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aspirin C Forte a k čemu se používá

Přípravek ASPIRIN C Forte obsahuje:

- kyselinu acetylsalicylovou, která zmírňuje bolest a snižuje horečku
- kyselinu askorbovou, také známou jako vitamin C.

Přípravek ASPIRIN C Forte se používá:

- k úlevě od příznaků mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, bolest zubů a menstruační bolesti
- k úlevě od příznaků bolesti a horečky při běžném nachlazení nebo příznacích podobných chřipce.

Přípravek ASPIRIN C Forte je určen pro dospělé a dospívající starší 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aspirin C Forte užívat

Neužívejte přípravek Aspirin C Forte:

- pokud jste alergický(á) na
 - kyselinu acetylsalicylovou, kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo
 - jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), což jsou léky, které se používají k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu.
- pokud máte příliš mnoho žírných buněk (preexistující mastocytóza). Užití kyseliny acetylsalicylové může vyvolat závažné hypersenzitivní reakce (včetně oběhového šoku se zarudnutím, nízkým
- krevním tlakem, rychlým tepem a zvracením).
- pokud jste prodělal(a) astma způsobené užitím kyseliny acetylsalicylové nebo příbuznými léky

(obzvláště NSAID)

- pokud jste ve třetím trimestru těhotenství (pokud jste těhotná více než 24 týdnů)
- pokud máte žaludeční nebo střevní vřed
- pokud krvácíte nebo u vás existuje riziko krvácení (krvácivý stav)
- pokud máte výrazně sníženou funkci jater nebo ledvin
- pokud máte výrazně sníženou nekontrolovanou srdeční funkci
- pokud jste léčeni methotrexátem v dávkách 15 mg týdně nebo více
- pokud užíváte léky na ředění krve a k prevenci vzniku krevních sraženin (perorální antikoagulantia) a prodělal(a) jste nebo jste měl(a) v minulosti žaludeční nebo střevní vřed
- jestliže máte ledvinové kameny, stav, při kterém se tvoří kameny, nebo ledvinové kameny v anamnéze (nefrolitiáza)
- jestliže máte vylučování moči obsahující velké množství krystalů šťavelanu vápenatého (hyperoxalurie)
- jestliže máte onemocnění, při kterém se v těle hromadí příliš mnoho železa (přetížení železem – hemochromatóza)

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aspirin C Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

- jestliže užíváte jiné léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, aby se předešlo riziku předávkování.
- jestliže se objeví bolesti hlavy při dlouhodobém užívání léků proti bolesti ve vysokých dávkách. Nezvyšujte dávku; spíše se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
- jestliže užíváte léky proti bolesti pravidelně, zejména kombinaci několika léků proti bolesti. Takové užívání může vést k trvalému poškození ledvin s rizikem snížené funkce ledvin.
- jestliže jste prodělal(a) nebo jste měl(a) v minulosti vřed, krvácení do žaludku nebo střev nebo zánět žaludku (gastritidu).
- jestliže rovněž užíváte léky na ředění krve a k prevenci vzniku krevních sraženin (antikoagulantia).
- **Přestaňte okamžitě užívat přípravek Aspirin C Forte a kontaktujte svého lékaře, pokud se objeví žaludeční či střevní krvácení nebo vředy.** Příznaky zahrnují krvácení z úst, krev ve stolici a černě zbarvenou stolici.
- jestliže máte sníženou funkci ledvin či problémy se srdcem nebo krevním oběhem, jako je např. cévní onemocnění ledvin, srdeční selhání, závažná operace nebo závažné krvácivé příhody. Užití kyseliny acetylsalicylové může dále snížit funkci ledvin až k akutnímu selhání ledvin. Neužívejte přípravek Aspirin C Forte, pokud máte významně sníženou funkci ledvin nebo nekontrolovanou srdeční funkci.
- jestliže máte poruchu funkce jater.
Neužívejte přípravek Aspirin C Forte, pokud máte těžkou poruchu funkce jater.
- jestliže trpíte silným menstruačním krvácením (může se zvýšit objem a délka menstruačního krvácení).
- jestliže jste podstoupili operaci.
Kyselina acetylsalicylová zvyšuje riziko krvácení; dokonce i v nízkých dávkách nebo pokud je užitá o několik dnů dříve. Informujte svého lékaře, chirurga, anesteziologa nebo zubního lékaře v případě nutnosti jakéhokoli chirurgického zákroku, i nezávažného (např. trhání zubu).
- kyselina acetylsalicylová zabraňuje vylučování kyseliny močové. To může způsobit dnu, pokud již máte sklon ke sníženému vylučování kyseliny močové.
- jestliže trpíte deficitem glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (G6PD): dědičným onemocněním postihujícím červené krvinky. Kyselina acetylsalicylová musí být podávána pod lékařským dohledem.
- jestliže trpíte poruchou využití železa (talasemií, sideroblastickou anemií).
- jestliže máte astma.
Neužívejte tento přípravek, pokud se na vás vztahuje třetí odrážka bodu 2 „Neužívejte přípravek Aspirin C Forte“. Kyselina acetylsalicylová může vyvolat křeče průduškového svalstva a astmatické záchvaty nebo jiné reakce z přecitlivělosti. Rizikovými faktory jsou:
 - astma v anamnéze

- senná rýma
- nosní polypy, dlouhodobé (chronické) onemocnění dýchacích cest nebo
- alergické reakce, např. na kůži (svědění, kopřivka atd.).
- nedoporučuje se užívat tento přípravek během kojení.

Při užívání kyseliny acetylsalicylové byly hlášeny závažné alergické reakce, které mohou zahrnovat bolest na hrudi a dokonce srdeční infarkt (Kounisův syndrom) (viz bod 4). Pokud si všimnete bolesti na hrudi v kombinaci s alergickými reakcemi (jako jsou kožní vyrážky, dušnost), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Děti a dospívající

Reyeův syndrom, velmi vzácné život ohrožující onemocnění spojené s neurologickým a jaterním poškozením, byl pozorován u dětí s virovým onemocněním (obzvláště chřipkou a planými neštovicemi), které užily kyselinu acetylsalicylovou. Z tohoto důvodu:

- kyselina acetylsalicylová smí být podávána dětem a dospívajícím v tomto stavu pouze na základě lékařského doporučení, pokud ostatní opatření selhala.
- objeví-li se příznaky závratě, mdloby, abnormálního chování nebo zvracení, přerušete léčbu a okamžitě informujte svého lékaře.

Užívání salicylátů je rovněž třeba se vyhnout po dobu 6 týdnů po očkování proti viru planých neštovic.

Další léčivé přípravky a přípravek Aspirin C Forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Aspirin C Forte, pokud se léčíte:

- **methotrexátem v dávce 15 mg týdně či více:** lék k léčbě těžkých zánětů kloubů, rakoviny a kožního onemocnění lupénky
Toxicita methotrexátu se zvyšuje.
- **léky k prevenci vzniku krevních sraženin** (perorální antikoagulancia) a máte v anamnéze vředy v žaludku nebo ve střevě
Zvyšuje se riziko krvácení.

Porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Aspirin C Forte, pokud užíváte některý z následujících léků:

Nedoporučené kombinace

- **léky k prevenci vzniku krevních sraženin** (perorální antikoagulancia) a nemáte-li v anamnéze vředy v žaludku nebo ve střevě
Zvyšuje se riziko krvácení.
- **klopidogrel** (s výjimkou schválených indikací pro tuto kombinaci) a tiklopidin: léky zabraňující srážení krve
Zvyšuje se riziko krvácení.
- léky k léčbě bolesti, horečky nebo zánětu patřící do skupiny takzvaných **nesteroidních protizánětlivých léků**
Zvyšuje se riziko vzniku vředů v žaludku nebo ve střevě a krvácení.
- **hepariny** v dávkách užívaných k léčbě (např. krevní sraženiny v cévě) nebo u pacientů ve věku 65 let a starších bez ohledu na dávku heparinu
Zvyšuje se riziko krvácení. Je třeba užívat jiné léky proti bolesti a horečce.
- **benzbromaron, probenecid:** léky na zvýšené vylučování kyseliny močové k léčbě dny
Účinek těchto léků se snižuje.

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnost při užívání:

- **methotrexát v dávce nižší než 15 mg týdně**
Toxicita methotrexátu se zvyšuje. U pacientů se sníženou funkcí ledvin a pacientů ve věku 65 let a starších je nezbytné pečlivé sledování. Viz také první odrážka prvního odstavce „Další léčivé přípravky a přípravek Aspirin C Forte“.
- **léky na zvýšené vylučování vody (diuretika)** a léky k léčbě **vysokého krevního tlaku** a jiných **srdečních chorob** s léčivými látkami, jejichž názvy končí na „pril“ nebo „sartan“ (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), antagonisté receptorů angiotenzinu II)
U dehydratovaných pacientů se může objevit rychlá ztráta funkce ledvin. Navíc může dojít k efektu snížení krevního tlaku.
- **klopidogrel (ve schválených indikacích pro tuto kombinaci):** lék, který zabraňuje srážení krve
Zvyšuje se riziko krvácení.
- **léky, které působí místně v žaludku nebo střevech, léky, které neutralizují nebo vážou žaludeční kyselinu (antacida), nebo aktivní uhlí,** k léčbě průjmu a akutních otrav
Užívejte tyto léky působící v žaludku nebo střevě nejméně s dvouhodinovým odstupem od přípravku Aspirin C Forte.
- **hepariny** v dávkách užívaných pro prevenci (např. krevních sraženin) u pacientů mladších než 65 let
Zvyšuje se riziko krvácení.
- **léky k rozpouštění krevních sraženin (trombolytika),** jako je např. **streptokináza**
Zvyšuje se riziko krvácení.
- **léky obsahující kortizon nebo látky podobné kortizonu (glukokortikoidy),** s výjimkou substituční léčby hydrokortizonem:
Zvyšuje se riziko krvácení.
- **selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu,** např. **citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin:** léky k léčbě deprese
Zvyšuje se riziko krvácení.
- **digoxin:** lék k léčbě srdečního selhání nebo nepravidelného srdečního rytmu
Zvyšuje se koncentrace digoxinu v krvi. Doporučuje se, aby lékař sledoval koncentrace digoxinu v krvi, a pokud je to nutné, upravil dávkování.
- **léky užívané ke snížení hladiny cukru v krvi (antidiabetika),** jako je **inzulín** nebo **sulfonylmočoviny**
Doporučuje se sledovat hladiny cukru v krvi.
- **kyselina valproová:** lék k léčbě epilepsie.
Zvyšuje se toxicita kyseliny valproové.

Kombinace, které je třeba vzít v úvahu:

- **deferasirox, deferoxamin:** léky používané k odstranění přebytečného železa z těla
Deferasirox: zvyšuje se riziko vzniku vředů v žaludku nebo ve střevě a krvácení.
Užívání deferoxaminu a kyseliny askorbové může zvýšit tkáňovou toxicitu železa, zejména v srdci.
- **železo a hliník:** podávání kyseliny askorbové zvyšuje vstřebávání z trávicího ústrojí. To je nutné vzít v úvahu, pokud máte sníženou funkci ledvin, v případě substituce železem a podávání antacid (léky proti překyselení žaludku) obsahujících hliník.
- **laboratorní testy**
Informujte svého lékaře, že užíváte přípravek Aspirin C Forte.
Kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová při vysokých dávkách mohou ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, jako je např. test na okultní krvácení do stolice nebo testy jaterních funkcí.
Vitamin C může ovlivnit některé laboratorní testy, jako je test glukózy, kreatininu, karbamazepinu, kyseliny močové v moči, séru.
Vitamin C může interferovat s testy, které měří glykémii v moči a krvi, což vede k falešným naměřeným hodnotám, i když nemá žádný vliv na hladiny glukózy v krvi.

Přípravek Aspirin C Forte s alkoholem

Vyhýbejte se konzumaci alkoholu, jestliže užíváte přípravek Aspirin C Forte.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství – poslední 3 měsíce těhotenství

Neužívejte přípravek Aspirin C Forte, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, protože by to mohlo poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek může Vašemu nenarozenému dítěti způsobit problémy s ledvinami a se srdcem. Může ovlivnit sklon ke krvácení jak u Vás, tak u Vašeho dítěte a může způsobit, že porod proběhne později nebo bude delší, než se očekávalo.

Těhotenství – prvních 6 měsíců těhotenství

Během prvních 6 měsíců těhotenství se přípravek Aspirin C Forte nemá užívat pokud to není nezbytně nutné a nedoporučí Vám to lékař. Pokud potřebujete léčbu během tohoto období nebo když se snažíte otěhotnět, má se použít nejnižší možná dávka po co nejkratší dobu. Pokud užíváte od 20. týdne těhotenství přípravek Aspirin C Forte po dobu delší než několik dní, může to způsobit Vašemu nenarozenému dítěti problémy s ledvinami, což může vést ke snížení hladiny plodové vody obklopující dítě (oligohydramnion) nebo ke zúžení tepny (ductus arteriosus) v srdci dítěte. Pokud potřebujete léčbu delší než několik dní, může Vám lékař doporučit další kontroly.

Neužívejte tento přípravek ve třetím trimestru (po 24. týdnu) těhotenství, protože může dojít k vážnému poškození Vašeho zdraví nebo zdraví nenarozeného dítěte.

Kojení

Léčba pomocí přípravku Aspirin C Forte **se nedoporučuje během kojení,** protože lék přechází do mateřského mléka.

Plodnost

Tento přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou snížit plodnost u žen. Tento účinek je vratný po vysazení léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může příležitostně způsobit bolest hlavy nebo závratě. Neříd'te dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, pokud pozorujete tyto účinky.

Přípravek Aspirin C Forte obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 474 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v každé šumivé tabletě. To odpovídá 23,7 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku v potravě pro dospělého.

3. Jak se přípravek Aspirin C Forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Pro perorální užití. Šumivou tabletu je před užitím nutné rozpustit ve sklenici vody. Šumivá tableta se nemá užívat na lačný žaludek, aby se omezilo podráždění žaludku.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí

- Jednorázová dávka: 1 šumivá tableta
- V případě potřeby lze jednorázovou dávku opakovat v intervalu alespoň 4 hodin mezi dávkami.
- Maximální denní dávka: 3 šumivé tablety

Použití u dětí a dospívajících

Dospívající: 12 let a starší

Má se užít co nejnižší účinná dávka.

Dávka závisí na hmotnosti dospívajícího. Tento přípravek má být užíván jen u dospívajících s tělesnou hmotností vyšší než 53 kg. Odkaz na věk je pouze pro informační účely.

Doporučená jednotlivá dávka pokud je to vhodné je 1 šumivá tableta (800 mg kyseliny acetylsalicylové/480 mg kyseliny askorbové). Celková denní dávka nesmí přesáhnout 3 tablety. Síla dávky přípravku Aspirin C Forte (800 mg kyseliny acetylsalicylové/480 mg kyseliny askorbové) nemusí být vhodná pro léčbu dospívajících.

Pro tuto věkovou skupinu jsou k dispozici jiné přípravky, které mají nižší obsah kyseliny acetylsalicylové.

Děti mladší než 12 let

Přípravek Aspirin C Forte nemá být podáván dětem mladším 12 let. V případě náhodného podání viz „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aspirin C Forte užívat“ a „Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin C Forte, než jste měl(a)“.

Pacienti ve věku 65 let a starší a pacienti s nízkou tělesnou hmotností

Má být užitá nejnižší účinná dávka z důvodu dalších možných poruch. Viz také bod 2 „Neužívejte přípravek Aspirin C Forte“ a „Upozornění a opatření“.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin nebo s problémy s krevním oběhem

Snížení dávky nebo prodloužené intervaly mezi dávkami se doporučují u pacientů s

- lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin
- problémy s krevním oběhem, jako je srdeční selhání a vážné krvácivé příhody

Neužívejte přípravek Aspirin C Forte, pokud máte těžkou poruchu funkce ledvin, jater nebo nekontrolovanou srdeční funkci. Viz bod 2 „Neužívejte přípravek Aspirin C Forte“

Délka užívání

Neužívejte tento přípravek po dobu delší než 3 dny u horečky nebo 3 až 4 dny při bolesti, pokud to není doporučeno lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aspirin C Forte, než jste měl(a)

Přerušete léčbu a ihned kontaktujte lékaře, pokud existuje podezření na předávkování

Příznaky předávkování mohou zahrnovat:

- ušní šelest, pocit ztráty sluchu
- pocení
- pocit na zvracení, zvracení, průjem
- bolest hlavy
- závratě
- rychlá ztráta funkce ledvin

U dětí může mít předávkování smrtelné následky už při jednorázovém podání kyseliny acetylsalicylové v dávce 100 mg/kg.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aspirin C Forte

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Aspirin C Forte a **ihned informujte svého lékaře** nebo jděte do nejbližší nemocnice, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků:

- otok obličeje, jazyka a hrtanu způsobující silné potíže s dýcháním, což jsou příznaky závažné alergické reakce (angioedém)
- bolest břicha, černá stolice, zvracení krve, zvratky podobné kávové sedlině, což jsou příznaky žaludečního nebo střevního krvácení

Nežádoucí účinky se mohou objevit s následující četností:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

- žaludeční nebo střevní poruchy, jako je pálení žáhy, průjem, pocit na zvracení, zvracení, zažívací potíže

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

- bolest žaludku, střev a břicha
- kopřivka (urtika), vyrážka, svědění (pruritus)

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů

- žaludeční a střevní zánět a vředy (záněty a vředy jícnu, žaludku nebo střev). Tyto reakce mohou nebo nemusí být spojeny s krvácením a může k nim dojít při jakémkoliv dávkě kyseliny acetylsalicylové a u pacientů s nebo bez varovných příznaků či předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod
- reakce přecitlivělosti, jako jsou příznaky astmatu, rýma a ucpaný nos

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí

- skryté (okultní) nebo zjevné krvácení ze žaludku nebo střev (zvracení krve, černá stolice atd.), což vede k chudokrevnosti z nedostatku železa. Riziko krvácení je závislé na dávce
- vředy a perforace žaludku a střev
- snížené vylučování kyseliny močové, což může vyvolat dnu u pacientů, kteří trpí sníženým vylučováním kyseliny močové

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

- zvýšené hladiny jaterních enzymů nazývaných aminotransferázy, snížená funkce jater
- poškození jater, především jaterních buněk
- snížený počet červených krvinek (anemie) v důsledku krvácení
- snížený počet červených krvinek a jejich poškození u pacientů se závažným deficitem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy
- snížený počet krevních destiček
- nízké hladiny glukózy v krvi (hypoglykemie)
- kožní reakce
- reakce z přecitlivělosti, závažné alergické reakce (anafylaktické reakce)
Reakce z přecitlivělosti mohou postihnout kůži, dýchací cesty, oběhový systém, žaludek a střeva, a to zejména u pacientů s astmatem. Symptomy zahrnují následující:
 - otoky tkání způsobené nadbytečnou tekutinou
 - pokles krevního tlaku
 - sípání, dušnost
 - srdeční nebo dechová tíseň
 - život ohrožující alergická šoková reakce

- vyrážka, kopřivka, svědění, závažné alergické reakce, které zahrnují otok obličeje nebo krku
- příznaky astmatu, zánět v nose, který způsobuje kýchání, rýmu a ucpaný nos
- akutní ischemie myokardu (bolestivé onemocnění srdce způsobené nedostatkem prokrvení srdečního svalu) se srdečním infarktem nebo bez něj vznikající jako součást alergické reakce (Kounisův syndrom)
- krvácení s prodlouženou dobou krvácení, jako je krvácení z nosu, krvácení z dásní, červené skvrny pod kůží, krvácení do močových a pohlavních orgánů
Riziko krvácení přetrvává 4–8 dnů po vysazení přípravku Aspirin C Forte. To může způsobit zvýšené riziko krvácení v případě chirurgického zákroku. Může se také objevit nitrolební krvácení a krvácení do žaludku nebo do střeva. Nitrolební krvácení může být smrtelné, zejména při podávání přípravku starším osobám.
- závažné krvácení, krvácení do mozku, a to zejména u pacientů s nekontrolovaným vysokým krevním tlakem a/nebo užívajících léky na potlačení srážení krve (antikoagulancia)
V ojedinělých případech může jít o potenciálně život ohrožující příhody.
- tekutina na plicích (nekardiogenní plicní edém) při chronickém užívání a v souvislosti s reakcí přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou.
- snížená funkce ledvin až do rychlé ztráty funkce ledvin, ledvinové kameny způsobené kyselinou askorbovou
- bolest hlavy, závratě, pocit ztráty sluchu, ušní šelest, což jsou příznaky předávkování
- Reyeův syndrom (poruchy vědomí, abnormální chování nebo zvracení) (viz bod 2. „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Aspirin C Forte“)
- onemocnění střevní bránice (zúžení střeva) (zejména při dlouhodobé léčbě).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím webového formuláře sukl.gov.cz/nezadouciucinky

případně na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49/48
100 00 Praha 10
e-mail: farmakovigilance@sukl.gov.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aspirin C Forte uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stripu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aspirin C Forte obsahuje

- Léčivými látkami jsou kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová.
Jedna šumivá tableta obsahuje:
 - 800 mg kyseliny acetylsalicylové a
 - 480 mg kyseliny askorbové
- Pomocnými látkami jsou:
modifikovaný hydrogenuhličitan sodný, kyselina citronová, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Jak přípravek Aspirin C Forte vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Aspirin C Forte jsou bílé až téměř bílé a kulaté tablety. Tablety jsou označeny na jedné straně logem firmy Bayer.

Přípravek Aspirin C Forte je k dispozici ve stripech (aluminium/papír) uložených v papírové krabici obsahující 10 nebo 20 šumivých tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Bayer Bitterfeld GmbH
Salegaster Chausee 1
06803 Bitterfeld-Wolfen
Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko	Aspirin + C forte 800 mg/480 mg Brausetabletten
Bulharsko	Аспирин С Форте 800 mg/ 480 mg ефервесцентни таблетки
Chorvatsko	Aspirin plus C forte 800 mg/480 mg šumeće tablete
Česká republika	ASPIRIN C Forte
Maďarsko	Aspirin Plus C Forte 800 mg/480 mg pezsgőtabletta
Rumunsko	ASPIRIN PLUS C FORTE 800 mg/ 480 mg comprimate efervescente

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 3. 2026.