

## OZNAČENÍ NA OBALU

### ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky  
ibuprofenum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje ibuprofenum 400 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol (E420). Další informace najdete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 měkkých tobolek  
12 měkkých tobolek  
20 měkkých tobolek  
30 měkkých tobolek  
50 měkkých tobolek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

<b>10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ</b>
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO</b>
------------------------------

Reg. č.: 29/075/15-C

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

Č. šarže

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------

- **Bolest hlavy**
- **Migréna**
- **Bolest zubů**
- **Bolest zad**
- **Menstruační bolest**

Ibalgin Rapidcaps 400 mg se používá k úlevě od bolesti hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti svalů, horečky a příznaků chřipky a nachlazení.

Ibalgin Rapidcaps 400 mg ve formě měkkých tobolek s kapalným obsahem se v těle snadno rozkládá, léčivá látka se rychleji vstřebává do krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti.

**Dospělí a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)** užívají 1 toboleku přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg až třikrát denně podle potřeby. Dodržujte interval alespoň 4 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Ibalgin Rapidcaps 400 mg není určen pro děti mladší 12 let (<40 kg) vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

ibalgin rapidcaps 400 mg

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH****Blistr****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké tobolky  
ibuprofenum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Logo Opella Healthcare Czech s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

*EXP*

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

*Č. šarže:*

**5. JINÉ**