

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Nurofen Junior pomeranč** 100 mg žvýkací měkká tobolka  
ibuprofen

Pro děti od 20 kg tělesné hmotnosti (7 let) do 40 kg tělesné hmotnosti (12 let).

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 100 mg ibuprofenu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje glukosu, sacharosu a sójový lecithin.  
Podrobnější informace viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

2 žvýkací měkké tobolky  
4 žvýkací měkké tobolky  
6 žvýkacích měkkých tobolek  
8 žvýkacích měkkých tobolek  
10 žvýkacích měkkých tobolek  
12 žvýkacích měkkých tobolek  
14 žvýkacích měkkých tobolek  
16 žvýkacích měkkých tobolek  
18 žvýkacích měkkých tobolek  
20 žvýkacích měkkých tobolek  
22 žvýkacích měkkých tobolek  
24 žvýkacích měkkých tobolek  
26 žvýkacích měkkých tobolek  
28 žvýkacích měkkých tobolek  
30 žvýkacích měkkých tobolek  
32 žvýkacích měkkých tobolek

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****Držitel rozhodnutí o registraci:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg. č. ČR: 07/642/15-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Nurofen Junior pomeranč je určen pro děti od 7 do 12 let s tělesnou hmotností 20 - 40 kg, ke snížení horečky a k úlevě od mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolest v krku, bolest zubů, bolest hlavy, bolest při zhmoždění nebo podvrknutí a ke zmírnění příznaků chřipky a nachlazení.

Tobolky rozžvýkejte a pak polkněte. Není nutné ji zapíjet tekutinou.

**Není určeno dětem mladším než 7 let nebo vážícím méně než 20 kg.**

| Hmotnost dítěte                                                                                                             | Věk       | Doporučená dávka                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 20–29 kg                                                                                                                    | 7-9 let   | 2 tobolky, 3-krát během 24 hodin |
| 30–40 kg                                                                                                                    | 10-12 let | 3 tobolky, 3-krát během 24 hodin |
| Jednotlivé dávky se mají podávat přibližně každých 6 až 8 hodin, s minimálním intervalem 6 hodin mezi jednotlivými dávkami. |           |                                  |

**VAROVÁNÍ:** Nepřekračujte stanovené dávkování.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě.

**Pokud je nutné přípravek užívat déle než 3 dny, nebo pokud se příznaky zhorší, poraďte se s lékařem.**

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

nurofen junior pomeranč

#### **17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

#### **18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**

Blistr

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

**Nurofen Junior pomeranč** 100 mg žvýkací měkká tobolka  
ibuprofen

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**