

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nurofen Prolong 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 300 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

tableta s prodlouženým uvolňováním

6 tablet s prodlouženým uvolňováním
8 tablet s prodlouženým uvolňováním
10 tablet s prodlouženým uvolňováním
12 tablet s prodlouženým uvolňováním
16 tablet s prodlouženým uvolňováním
20 tablet s prodlouženým uvolňováním
24 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před užitím si přečtěte příbalovou informaci.

Tablety polykejte v celku a zapíjejte vodou. Tablety nekousejte, nelámejte, nedrťte ani necucejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/305/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, u níž se očekává, že bude trvat déle než 6-8 hodin, jako je bolest zad, svalů, kloubů, menstruační bolest a bolest zubů.

Dospělí (od 18 let) včetně starších pacientů

Počáteční dávka: dvě tablety (2 x 300 mg ibuprofenu).

Dále podle potřeby užíjte po 12 hodinách další dávku dvou tablet (2 x 300 mg ibuprofenu).

Tablety s prodlouženým uvolňováním. Dodržujte časový odstup mezi jednotlivými dávkami nejméně 12 hodin. Tento léčivý přípravek je vyroben tak, aby docházelo k uvolňování ibuprofenu pomalu po dobu 12 hodin.

Neužívejte více než 4 tablety během 24 hodin.

Maximální denní dávka je 1200 mg ibuprofenu (odpovídá 4 tabletám).

Nepoužívat u dětí a dospívajících do 18 let.

Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jedna dávka (dvě tablety) každých 12 hodin.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

NUROFEN PROLONG 300 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

PC:

SN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Blistr****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Nurofen Prolong 300 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

vytištěno na blistru

4. ČÍSLO ŠARŽE

vytištěno na blistru

5. JINÉ