

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flexiora 10 mg/g gel
sodná sůl diklofenaku

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel
30 g
50 g
60 g
100 g
120 g
150 g
200 g

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšmu použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Po otevření spotřebujte do 1 roku.

Datum otevření:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 29/229/17-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Flexiora se u dospělých používá k úlevě od bolesti a ke zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. natažením, podvrtnutím a pohmožděním.

U dospívajících od 14 let: ke krátkodobé místní léčbě bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Nanášejte gel lokálně na kůži postižené oblasti 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství gelu odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle velikosti léčené oblasti.

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

flexiora

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

tuba (30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g and 200 g)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flexiora 10 mg/g gel
sodná sůl diklofenaku

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel
30 g
50 g
60 g
100 g
120 g
150 g
200 g

5. ZPŮSOB A CESTA

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Po otevření spotřebujte do 1 roku.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 29/229/17-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

U dospělých: k úlevě od bolesti a ke zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů. U dospívajících od 14 let: ke krátkodobé místní léčbě bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění.

Nanášejte gel na postiženou oblast 3 až 4krát denně v množství o velikosti třešně až vlašského ořechu a jemně vtírejte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**