

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sensicutan 200 IU/g + 3 mg/g krém
sodná sůl heparinu/levomenol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram krému obsahuje 200 IU (m.j.) sodné soli heparinu a 3 mg levomenolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C12-C16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol-alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydroxylovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém

30 g

80 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOSTI

Použitelné do:

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH
Plinganserstr. 40
D-81369 Mnichov, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 46/297/99-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (ekzémy, alergická onemocnění kůže, atopický ekzém, zánět kůže). Neurčí-li lékař jinak, nanášejte krém 2-3krát denně na postižená místa kůže.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 3 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Sensicutan

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
tuba

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sensicutan 200 IU/g + 3 mg/g krém
sodná sůl heparinu/levomenol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram krému obsahuje 200 IU (m.j.) sodné soli heparinu a 3 mg levomenolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C12-C16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol-alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydroxy- lovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Krém

30 g

80 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH
Plinganserstr. 40
D-81369 Mnichov, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (ekzémy, alergická onemocnění kůže, atopický ekzém, zánět kůže). Neurčí-li lékař jinak, nanášejte krém 2-3krát denně na postižená místa kůže.
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 3 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM