Height - 120mm

Manufactured in Germany for Vitaflo International Ltd,
Suite 1.11, South Harrington Building,
182 Sefton Street, Brunswick Business Park,
Liverpool, L3 4BQ.
Tel: +44(0)151 709 9020
Web: www.vitaflo.co.uk
E-mail: vitaflo@vitaflo.co.uk
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A
Distributed in Australia by: Vitaflo Australia Pty Ltd
Unit 3/119 Balliang St, South Geelong, VIC 3220.
Tel: 03 5229 8222
Web: www.vitaflo.com.au
E-mail: enquiry@vitaflo.com.au
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A
Hergestellt in Deutschland für Vitaflo International Ltd
Vitaflo Deutschland GmbH
Industriestraße 17
61449 Steinbach (Taunus)
+49 (0) 6172 253 234 0
Web: www.vitaflo.de E-Mail: info@vitaflo.de
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.A
Produceret i Tyskland for Vitaflo International Ltd
Nordisk forhandler: Navamedic AB,
Box 24032, 400 22 Goteborg, Sweden.
Tel: +46 31 335 1190.
Web: www.navamedic.com E-mail: info@navamedic.com
*Registrert varemerke til Société des Produits Nestlé S.A
*Reg. Varemærke fra Société des Produits Nestlé S.A
*Registrerat varumärke tillhörande Société des Produits Nestlé S.A
Fabricado en Alemania para Vitaflo International Ltd.
Distribuido en España por Nestlé España, S.A.
Edificio Nestlé
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona
Tel: 900 10 50 86
Web: www.vitafloweb.com
E-mail: vitaflo@es.nestle.com
*Marca Registrada de Société des Produits Nestlé S.A.
Fabriqué en Allemagne pour Vitaflo International Ltd
Distribué en Belgique et au Luxembourg par
Vitaflo International Ltd
Tel: +32 (0)3 291 02 30
Web: www.vitaflo.be
E-mail: vitaflo-benelux@vitaflo.co.uk
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A

Distribué en France par Vitaflo France
38 rue de Berri 75008 Paris
Tel: +33 (0)1 47 23 51 20
Web: www.vitaflo.fr
E-mail: vitaflo-france@vitafloweb.com
*Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A
Παρασκευάζεται στη Γερμανία για την Vitaflo International Ltd.
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
Medihub
Γούναρη 119
16561 Γλυφάδα
Τηλ.: +30 2106003393
Φαξ.: +30 2106005110
E-mail: info@medihub.gr
*Σήμα κατατεθέν της εταιρίας Société des Produits Nestlé S.A
Prodotto in Germania per Vitaflo International Ltd
Suite 1.11, South Harrington Building,
182 Sefton Street,
Brunswick Business Park,
Liverpool, Regno Unito.
Servizio Consumatori Nestlé Italiana:
Numero Verde 800-434434
www.nestlehealthscience.it
*Marchio registrato di proprietà di Société des Produits Nestlé S.A
Geproduceerd in Duitsland voor Vitaflo International Ltd.
Verdeeld in België en Nederland door
Vitaflo International Ltd.
Web: www.vitaflo.be www.vitaflo.nl
E-mail: vitaflo-benelux@vitaflo.co.uk
Tel: +32 (0)3 291 02 30
*Geregistreerd merk van Société des Produits Nestlé S.A.
Fabricado na Alemanha para Vitaflo International, Ltd
Distribuido por Glutamine, Lda Rua do Outeiro 345 L 4485-029 Aveleda VCD
Portugal.
Tel: +351 229 966 373
Web: www.glutamine.pt
E-mail: info@glutamine.pt
*Marca registada da Sociedade de Produtos Nestlé, SA.

Vitaflo International Ltd için Almanya'da üretilmiştir.
Vitaflo International Limited, Suite 1.11 South Harrington Building,
182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool L3 4BQ İngiltere
İthalatçı firma: Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.
Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 A Blok Kat:6
34398 Maslak-Şişli/İstanbul TÜRKİYE
Tel: (0 212) 329 60 00
Web: www.nestlehealthscience.com.tr
*Société des Produits Nestlé S.A. tescilli markasıdır.
Vyrobeno v Německu pro Vitaflo International Ltd.
Vitaflo International Ltd., Suite 1.11, South Harrington Building, 182 Sefton Street, Brunswick Business Park,
Liverpool, L3 4BQ, United Kingdom.
Web: www.vitafloweb.com
E-mail: vitaflo@vitaflo.co.uk
Distributor: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4,
Česká republika. Tel.: 800 135 135
* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A
Vyrobené v Nemecku pre Vitaflo International Ltd.
Vitaflo International Ltd., Suite 1.11, South Harrington Building,
182 Sefton Street, Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ, Veľká Británia
Web: www.vitafloweb.com
E-mail: vitaflo@vitaflo.co.uk
Distribútor: Nestlé Slovensko s.r.o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza,
Slovenská republika. Tel.: 0800 135 135
* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.
Németországban gyártva, a Vitaflo International Ltd részére.
Vitaflo International Ltd., Suite 1.11,
South Harrington Building, 182 Sefton Street,
Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ.
Forgalmazza: Nestlé Hungária Kft. 1095 Budapest,
Lechner Ödön fasor 7.
Nestlé Fogyasztói Szolgálat tel.: 06 80 442 881
* Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Wyprodukowano w
Wyprodukowano w Niemczech dla Vitaflo International Ltd
Suite 1.11, South Harrington Building, 182 Sefton Street,
Brunswick Business Park, Liverpool, L3 4BQ
Serwis Konsumenta: +48 801 333 000
Email: vitaflo@vitaflo.co.uk
Web: www.vitaflo.pl
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
*Właścicielem znaków towarowych jest Société des Produits Nestlé S.A

Base Label - 165mm

☐ Final cutter guide
☐ Colour bleed
☐ Maximum text area
▨ Glue area - no print

DENNY BROS GRIDLINE

Job Info	28pp resealable Unibook
Date	05/03/2014
Label Size	120x165mm
Leaflet Size	120x155mm(folded), 120x300mm(unfolded)
Created By	JS

Please tick ☑ to indicate approval to match and proceed to print ☐

Please follow the instructions on the Artwork Instruction Sheet when using this Gridline to create artwork

APPROVED
By Dagmar Grexová at 2:16 pm, Aug 03, 2018

APPROVED
By Guřanová Kateřina at 12:56 pm, Aug 03, 2018

Height - 120mm

Page 28 - 145mm

Phenylketonuria • Phenylketonurie • Phenylketonuri
Fenilcetonuria • Phénylcétonurie • Φαινυλκετονουρία
Fenilchetonuria • Fenylketonurie • Fenylketonuri • Fenilcetonuria • Fenilketonüri •
Fenylketonurie • Fenilketonúria • Fenyloketonuria • Fenylketonúria

- **EN** FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES - flavoured options with sugar and sweetener
- **DE AT** LEBENSMITTEL FÜR BESONDERE MEDIZINISCHE ZWECKE (BILANZIERTE DIÄT) - mit Zucker und Süßungsmittel
- **DK** FØDEVARER TIL SÆRLIGE MEDICINSKE FORMÅL - indeholder sukker og sødestoffer
- **ES** ALIMENTO PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES - con azúcares y edulcorantes.
- **FR BE** DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES - contient des sucres et un édulcorant
- **GR** ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - με σάκχαρα και γλυκαντική ουσία
- **IT** ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI - con zucchero ed edulcorante
- **NL BE** VOEDING VOOR MEDISCH GEBRUIK- bevat suiker en zoetmiddel
- **NO** NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL - inneholder sukker och søtningsmiddel
- **PT** ALIMENTO PARA FINS MEDICINAIS ESPECÍFICOS - contém açúcar e adoçantes
- **SE** LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL - innehåller socker og sødestoffer
- **TR** ÖZEL TIBBI AMAÇLI GIDA - aromalı seçenekler şeker ve tatlandırıcı içerir
- **CZ** POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY - s cukrem a sladidlem
- **SK** POTRAVINY NA OSOBITNÉ LEKÁRSKE ÚČELY - obsahuje cukor a sladidlo
- **HU** SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - ÉLELMISZER - az ízesített termékek cukorral és édesítőszerrel
- **PL** ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO- warianty smakowe zwierają cukier i substancję słodzącą

PKU gel

Vitaflo
Innovation in Nutrition

L0060_F7_MLL

For further information: Peel back the label / Für weitere Informationen: Etikett aufziehen

Front Cover (Page 1) - 155mm

For further information: Peel back the label / Für weitere Informationen: Etikett aufziehen

EN

FOOD FOR SPECIAL MEDICAL PURPOSES.

PKU Gel is a powdered phenylalanine free protein substitute, available in unflavoured, orange and raspberry flavoured options containing essential and non-essential amino acids, carbohydrate, sugars, vitamins, minerals, trace elements. For the dietary management of Phenylketonuria (PKU).
Flavoured options with sugar and sweetener

Dosage And Administration
To be determined by the clinician or dietitian and is dependent on the age, body weight and medical condition of the patient.

Preparation Guidelines
For best results the product should be freshly prepared and when possible used immediately.
IMPORTANT - Water or permitted drinks should be taken after the gel or drink.

Flavour Ideas
The unflavoured product can be flavoured using Vitaflo FlavourPac sachets, available in blackcurrant, lemon, orange, raspberry and tropical. Simply add ½ a flavour sachet to the unflavoured product and make up as directed.

Important Notice
Must only be consumed by children with proven Phenylketonuria under strict medical supervision.
Unflavoured option suitable from 6 months to 10 years of age.
Flavoured options suitable from 1 to 10 years of age.
Diet must be supplemented with natural protein, water and other nutrients in prescribed quantities to supply the phenylalanine, fluid and general nutritional requirements.
Not to be used as a sole source of nutrition.
For enteral use only.

Storage
Store in a cool, dry place. Sachets are designed for single use, any unused powder in sachet should be stored in a refrigerator and used within 24 hours.

Ingredients
PKU Gel Unflavoured
Sucrose, Starch, L-Lysine L-Aspartate, Modified Starch, L-Leucine, L-Tyrosine, Glycine, L-Arginine L-Aspartate, L-Valine, L-Glutamine, L-Proline, L-Threonine, L-Isoleucine, Tri Calcium Phosphate, L-Serine, Calcium Glycerophosphate, L-Alanine, L-Histidine, Tri Sodium Citrate, Magnesium Hydrogen Phosphate, Tri Potassium Citrate, L-Cystine, Potassium Chloride, L-Tryptophan, L-Methionine, Choline Bitartrate, L-Arginine, Maltodextrin, Sodium Chloride, L-Ascorbic Acid, Taurine , L-Carnitine L-Tartrate, Nicotinamide, Ferrous Sulphate, Zinc Gluconate, DL-Alpha Tocopheryl- Acetate, D-Calcium Pantothenate, Manganese Gluconate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Copper Gluconate, Retinyl Acetate, Folic Acid (Pteroylmonoglutamic Acid), Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Vitamin K (Phylloquinone), Sodium Selenite, D-Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Raspberry
Sucrose, Starch, L-Lysine L-Aspartate, Modified Starch, L-Leucine, L-Tyrosine, Glycine, L-Arginine L-Aspartate, L-Valine, L-Glutamine, L-Proline, L-Threonine, L-Isoleucine, Tri Calcium Phosphate, L-Serine, Calcium Glycerophosphate, L-Alanine, L-Histidine, Tri Sodium Citrate, Magnesium Hydrogen Phosphate, Tri Potassium Citrate, L-Cystine, Potassium Chloride, Acidity Regulator (E296), L-Tryptophan, L-Methionine, Choline Bitartrate, L-Arginine, Flavouring, Colour(E162), Maltodextrin, Sodium Chloride, L-Ascorbic Acid, Taurine , Artificial Sweetener(Acesulfame K), L-Carnitine L-Tartrate, Nicotinamide, Ferrous Sulphate, Zinc Gluconate, DL-Alpha Tocopheryl- Acetate, D-Calcium Pantothenate, Manganese Gluconate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Copper Gluconate, Retinyl Acetate, Folic Acid (Pteroylmonoglutamic Acid), Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Vitamin K (Phylloquinone), Sodium Selenite, D-Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Orange
Sucrose, Starch, L-Lysine L-Aspartate, Modified Starch, L-Leucine, L-Tyrosine, Glycine, L-Arginine L-Aspartate, L-Valine, L-Glutamine, L-Proline, L-Threonine, L-Isoleucine, Acidity Regulator (E330), Tri Calcium Phosphate, L-Serine, Calcium Glycerophosphate, L-Alanine, L-Histidine, Tri Sodium Citrate, Magnesium Hydrogen Phosphate, Flavouring, Tri Potassium Citrate, L-Cystine, Potassium Chloride, L-Tryptophan, L-Methionine, Choline Bitartrate, L-Arginine, Maltodextrin, Emulsifier (**Soya** Lecithin), Sodium Chloride, L-Ascorbic Acid, Artificial Sweetener (Acesulfame K), Taurine , L-Carnitine L-Tartrate, Colours (E160a, E162), Nicotinamide, Ferrous Sulphate, Zinc Gluconate, DL-Alpha Tocopheryl- Acetate, D-Calcium Pantothenate, Manganese Gluconate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamin Hydrochloride, Copper Gluconate, Retinyl Acetate, Folic Acid (Pteroylmonoglutamic Acid), Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Vitamin K (Phylloquinone), Sodium Selenite, D-Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Best Before End / Batch Number:
See side of box

Inside Cover (Page 2)

Výživové údaje / Átlagos tápérték / Wartość odżywcza

CZ	SK	HU	PL		NEOCHUCENÝ / NEOCHUTENÝ / NATÚR ÍZŰ / SMAK NEUTRALNY 100g	24g	OCHUCENÝ / OCHUTENÝ / MÁLNA ÍZŰ / NARANCS ÍZŰ / WARIANT SMAKOWY 100g	24g
Kyselina listová (Folát)	Kyselina listová (Folát)	Folsav (Folát)	kwas foliowy (foliany)	µg	208 (347)	50 (83)	208 (347)	50 (83)
Vitamín B12	Vitamín B12	B12-vitamin	Witamina B12	µg	2.0	0.48	2.0	0.48
Kyselina pantothenová	Kyselina pantoténová	Pantoténsav	Kwas pantotenowy	mg	5.0	1.2	5.0	1.2
Biotin	Biotín	Biotin	Biotyna	µg	25	6.0	25	6.0
Sodík	Sodík	Nátrium	Sód	mg	379	91	379	91
				mmol	16.3	3.9	16.3	3.9
Chloridy	Chloridy	Klorid	Chlorki	mg	583	140	583	140
				mmol	16.3	3.9	16.3	3.9
Draslík	Draslík	Kálium	Potas	mg	938	225	938	225
				mmol	23.5	5.6	23.5	5.6
Vápník	Vápnik	Kalcium	Wapń	mg	1083	260	1083	260
				mmol	27.1	6.5	27.1	6.5
Fosfor	Fosfor	Foszfor	Fosfor	mg	825	198	825	198
				mmol	26.4	6.3	26.4	6.3
Hořčík	Horčík	Magnézium	Magnez	mg	167	40	167	40
				mmol	6.8	1.6	6.8	1.6
Železo	Železo	Vas	Żelazo	mg	14	3.4	14	3.4
Zinek	Zinok	Cink	Cynk	mg	11	2.6	11	2.6
Měď	Meď	Réz	Miedź	mg	0.80	0.19	0.80	0.19
Jód	Jód	Jód	Jod	µg	138	33.1	138	33.1
Selen	Selén	Szelén	Selen	µg	35	8.4	35	8.4
Mangan	Mangán	Mangán	Mangan	mg	1.7	0.41	1.7	0.41
Chrom	Chróm	Króm	Chrom	µg	71	17	71	17
Molybden	Molybdén	Molibdén	Molibden	µg	50	12	50	12
Cholin	Cholín	Kolin	Cholina	mg	279	67	279	67

Osmolalita / ozmolalita / Osmolalitás / Osmolalność: 24g + 30ml = 3000 mOsm/kg / 24g + 80ml = 1540 mOsm/kg

Page 27

Height - 120mm

DK

FØDEVARER TIL SÆRLIGE MEDICINSKE FORMÅL

PKU Gel er et fenylalaninfrit proteinsubstitut med smagsvarianterne: neutral, hindbær og appelsinsmag. Det indeholder essentielle og ikke-essentielle aminosyrer, kulhydrater, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Til ernæringsmæssig håndtering af phenylketonuri (PKU).
Smagstilsatte alternativer indeholder sødestoffer.

Dosis og administration
Dosis skal fastlægges af læge/klinisk diætist og er afhængig af patientens alder, vægt og medicinske tilstand.

Tilberedning
For bedste resultat skal produktet indtages umiddelbart efter forberedelsen.
Vigtigt - Vand eller anden tilladt væske skal indtages bagefter.

Smagsvarianter
Det er muligt at smagstilsætte de neutrale produkter med Vitaflos FlavourPac.
FlavourPac fås i smagsvarianterne: Solbær, lemon, appelsin, hindbær og tropisk smag.
Der skal tilsættes ½-1 pose FlavourPac alt efter smag.

Vigtigt
Må kun anvendes til børn med diagnosticeret Phenylketonuri og under strengt medicinsk opsyn.

De neutrale produkter er anvendelige fra 6 måneder til 10 år. Smagstilsatte varianter egner sig fra 1-10 år. Diæten må suppleres med naturligt protein, væske og andre næringsstoffer i foreskrevne mængder for at tilføre fenylalanin og væske og møde de specifikke ernæringsmæssige krav. Kan ikke anvendes som eneste ernæring. Ikke til intravenøs brug.

Opbevaring
Opbevares på et koldt og tørt sted. Poserne er beregnet til engangsdosis, eventuelt overskydende pulver i posen skal opbevares i køleskab og anvendes indenfor 24 timer.

Ingredienser
PKU Gel Neutral
Sukrose, Stivelse, L-Lysin L-Aspartat, Modificeret Stivelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalciumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenfosfat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Natriumklorid, L-Askorbinsyre, Taurin, L-Carnitin L-Tartrat, Nicotinamid, Jernsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kobberglukonat, Retinylacetat, Folsyre (pteroylmonoglutaminsyre), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Hindbær
Sukrose, Stivelse, L-Lysin L-Aspartat, Modificeret Stivelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalciumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenfosfat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, surhedsregulerende middel (E296), L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Smagsstof, Farvestof (E162), Maltodextrin, Natriumklorid, L-Askorbinsyre, Taurin, Artificial sødemiddel (Acesulfam K), L-Carnitin L-Tartrat, Nicotinamid, Jernsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kobberglukonat, Retinylacetat, Folsyre (pteroylmonoglutaminsyre), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Appelsin
Sukrose, Stivelse, L-Lysin L-Aspartat, Modificeret Stivelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, surhedsregulerende middel (E330), Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalcium Glycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenfosfat, Smaksstoff, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Emulgator (**Soya Lecitin**), Natriumklorid, L-Askorbinsyre, Artificial sødemiddel (Acesulfam K), Taurin, L-Carnitin L-Tartrat, Farvestof (E160a, E162), Nicotinamid, Jernsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kobberglukonat, Retinylacetat, Folsyre (pteroylmonoglutaminsyre), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Bedst før udgangen af / Batchnummer } **Se på siden af kassen**

Page 4 - 145mm

Διατροφικές Πληροφορίες / Informazioni nutrizionali / Voedingswaarde / Nährwertangaben / Informação Nutricional /Beslenme Bilgisi

GR	IT	NL/BE	PT	TR		ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ / GUSTO NEUTRO / NIET-GEAROMATISEERD / SABOR NEUTRO / NEUTRAL SMAK / AROMASIZ 100g	24g	ΜΕ ΓΕΥΣΗ / AROMATIZZATI / FLAVOURED / GEAROMATISEERD / AROMALI 100g	24g
Φυλλικό οξύ (Φολικό)	Acido Folico (folato)	Foliumzuur (folaat)	Ácido Fólico (Folatos)	Folik asit (Folat)	µg	208 (347)	50 (83)	208 (347)	50 (83)
Βιταμίνη B12	Vitamina B12	Vitamine B12	Vitamina B12	Vitamin B12	µg	2.0	0.48	2.0	0.48
Παντοθενικό οξύ	Acido Pantotenico	Pantotheenzuur	Ác. pantoténico	Pantotenik asit	mg	5.0	1.2	5.0	1.2
Βιοτίνη	Biotina	Biotine	Biotina	Biyotin	µg	25	6.0	25	6.0
Νάτριο	Sodio	Natrium	Sódio	Sodyum	mg	379	91	379	91
					mmol	16.3	3.9	16.3	3.9
Χλώριο	Cloruro	Chloor	Cloro	Klor	mg	583	140	583	140
					mmol	16.3	3.9	16.3	3.9
Κάλιο	Potassio	Kalium	Potássio	Potasyum	mg	938	225	938	225
					mmol	23.5	5.6	23.5	5.6
Ασβέστιο	Calcio	Calcium	Cálcio	Kalsiyum	mg	1083	260	1083	260
					mmol	27.1	6.5	27.1	6.5
Φώσφορος	Fosforo	Fosfor	Fósforo	Fosfor	mg	825	198	825	198
					mmol	26.4	6.3	26.4	6.3
Μαγνήσιο	Magnesio	Magnesium	Magnésio	Magnezyum	mg	167	40	167	40
					mmol	6.8	1.6	6.8	1.6
Σίδηρος	Ferro	IJzer	Ferro	Demir	mg	14	3.4	14	3.4
Ψευδάργυρος	Zinco	Zink	Zinco	Çinko	mg	11	2.6	11	2.6
Χαλκός	Rame	Koper	Cobre	Bakır	mg	0.80	0.19	0.80	0.19
Ιώδιο	Iodio	Jood	Iodo	İyot	µg	138	33.1	138	33.1
Σελήνιο	Selenio	Selenium	Selénio	Selenyum	µg	35	8.4	35	8.4
Μαγγάνιο	Manganese	Mangaan	Manganésio	Manganez	mg	1.7	0.41	1.7	0.41
Χρώμιο	Cromo	Chroom	Crómio	Krom	µg	71	17	71	17
Μολυβδαίνιο	Molibdeno	Molybdeen	Molibdénio	Molibden	µg	50	12	50	12
Χολίνη	Colina	Choline	Colina	Kolin	mg	279	67	279	67

Ωσμωτικότητα/Osmolalità/Osmolaliteit/Osmolalidade/Osmolalite: 24g + 30ml = 3000 mOsm/kg / 24g + 80ml = 1540 mOsm/kg

Page 25 - 145mm

Výživové údaje / Átlagos tápérték / Wartość odżywcza

CZ	SK	HU	PL		NEOCHUCENÝ / NEOCHUTENÝ / NATÚR ÍZŰ / SMAK NEUTRALNY 100g	24g	OCHUCENÝ / OCHUTENÝ / MÁLNA ÍZŰ / NARANCS ÍZŰ / WARIANT SMAKOWY 100g	24g
Energie	Energia	Energia	Wartość	kJ	1440	346	1341	322
			energetyczna	kcal	339	81	316	76
Tuky	Tuky	Zsír	Tłuszcz	g	0.05	0.02	0.05	0.02
z toho nasycené	z toho	amelyből	w tym kwasy					
mastné kyseliny	nasýtené mastné kyseliny	telített zsírsavak	tłuszczowe nasycone	g	0	0	0	0
Sacharidy	Sacharidy	Szénhidrát	Węglowodany	g	42.9	10.3	37.1	8.9
z toho cukry	z toho cukry	amelyből cukrok	w tym cukry	g	27.1	6.5	20	4.8
Bílkovinný ekvivalent	Bielkovinový ekvivalent	Fehérje ekvivalens	Równoważnik białka	g	41.7	10	41.7	10
L-fenylalanin	L-fenylalanín	L-fenilalanin	L-fenyloalanina	g	0	0	0	0
Sůl	Soľ	Só	Sól	g	0.95	0.23	0.95	0.23
Vitamíny a	**Vitamíny a**	**Vitaminok /**	**Witaminy/**					
Minerální látky	**Minerálne látky**	**Ásványi anyagok**	**Składniki mineralne**					
Vitamin A (RE)	Vitamín A (RE)	A-vitamin (RE)	Witamina A (RE)	µg	600	144	600	144
Vitamin D	Vitamín D	D-vitamin	Witamina D	µg	14.6	3.5	14.6	3.5
Vitamin E (αTE)	Vitamín E (αTE)	E-vitamin (αTE)	Witamina E (αTE)	mg	9.0	2.2	9.0	2.2
Vitamin K	Vitamín K	K-vitamin	Witamina K	µg	41	9.8	41	9.8
Vitamin C	Vitamín C	C-vitamin	Witamina C	mg	63	15	63	15
Thiamin	Vitamín B1 (tiamín)	Tiamin	Tiamina	mg	1.0	0.24	1.0	0.24
Riboflavin	Vitamín B2 (riboflavín)	Riboflavin	Ryboflawina	mg	1.2	0.29	1.2	0.29
Vitamin B6	Vitamín B6	B6-vitamin	Witamina B6	mg	1.1	0.26	1.1	0.26
Niacin	Niacín	Niacin	Niacyna	mg (NE)	14 (30.7)	3.4 (7.4)	14 (30.7)	3.4 (7.4)

Page 26

DE AT

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

Himbeere und Orange: mit Zucker und Süßungsmittel
Zum Diätmanagement bei Phenylketonurie (PKU) bzw. Hyperphenylalaninämie (HPA) ab dem 6. Lebensmonat bis 10 Jahre.
PKU Gel ist eine phenylalaninfreie Aminosäurenmischung in Pulverform mit Zusatz von essentiellen und nicht-essentiellen Aminosäuren, Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Das Produkt ist erhältlich in den Geschmacksrichtungen: "Orange", "Himbeere" oder geschmacksneutral.

Dosierung und Anwendung
Die Tagesdosis wird vom Arzt oder Ernährungsberater / Diätologen festgelegt und richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechsellage.

Zubereitungshinweise
PKU Gel sollte möglichst stets frisch zubereitet und sofort konsumiert werden. Falls erforderlich kann das Produkt (Gel oder Drink) nach der Zubereitung im Kühlschrank aufbewahrt und innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden. Vor Gebrauch nochmals gut aufrühren oder aufschütteln.
WICHTIG - Nach der Einnahme von PKU Gel (Gel oder Drink) sollten ausreichend Wasser oder andere erlaubte Flüssigkeiten getrunken werden.

Hinweise für mehr Geschmack
PKU Gel geschmacksneutral kann ab einem Alter von 12 Monaten mit unterschiedlichen Vitaflo FlavourPacs aromatisiert werden. Diese sind verfügbar in den Geschmacksrichtungen Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Himbeere und Tropical. Einfach ½ oder ganzen Portionsbeutel Aroma zusammen mit dem Pulver in den Schüttelbecher geben und die weiteren Zubereitungshinweise beachten.

WICHTIGE HINWEISE
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- PKU Gel "geschmacksneutral" ist für Kinder ab dem 6. Lebensmonat bis 10 Jahre geeignet.
- PKU Gel "Himbeere" und "Orange" ist für Kinder ab 12 Monaten bis 10 Jahre geeignet.
- Darf nur bei diagnostizierter PKU/HPA verwendet werden. Die Diät erfordert eine bedarfsgerechte Zufuhr an Energie, natürlichem Eiweiß, Wasser und anderen Nährstoffen.
- Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.
- Nicht zur parenteralen Verwendung geeignet.
- Aufgrund der besonderen Ernährungserfordernisse bei PKU im ersten Lebensjahr sind die Gehalte an den Vitaminen D, Folsäure, Niacin, B12 sowie an den Mineralstoffen Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Jod, Mangan, Molybdän, Selen und Chrom erhöht.

Lagerung
Kühl und trocken lagern. Ein Beutel entspricht einer Portion. Angebrochenen Portionsbeutel gut verschließen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verbrauchen.

Zutaten
PKU Gel geschmacksneutral
Saccharose, Stärke, L-Lysin-L-Aspartat, Modifizierte Stärke, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin-L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Threonin, L-Isoleucin, Tricalciumphosphat, L-Serin, Calciumglycerophosphat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenphosphat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumchlorid, L-Tryptophan, L-Methionin, Cholinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Natriumchlorid, L-Ascorbinsäure, Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, Nicotinamid, Eisensulfat, Zinkgluconat, DL-Alpha-Tocopherylacetat, D-Calciumpantothenat, Mangangluconat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Kupfergluconat, Retinylacetat, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Phyllochinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Himbeere
Saccharose, Stärke, L-Lysin-L-Aspartat, Modifizierte Stärke, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin-L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Threonin, L-Isoleucin, Tricalciumphosphat, L-Serin, Calciumglycerophosphat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenphosphat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumchlorid, Säureregulator: (E296), L-Tryptophan, L-Methionin, Cholinbitartrat, L-Arginin, Aroma, Farbstoff: (E 162), Maltodextrin, Natriumchlorid, L-Ascorbinsäure, Taurin, Süßungsmittel: (E 950), L-Carnitin-L-Tartrat, Nicotinamid, Eisensulfat, Zinkgluconat, DL-Alpha-Tocopherylacetat, D-Calciumpantothenat, Mangangluconat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Kupfergluconat, Retinylacetat, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Phyllochinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Orange
Saccharose, Stärke, L-Lysin-L-Aspartat, Modifizierte Stärke, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin-L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Threonin, L-Isoleucin, Säureregulator: Citronensäure, Tricalciumphosphat, L-Serin, Calciumglycerophosphat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenphosphat, Aroma, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumchlorid, L-Tryptophan, L-Methionin, Cholinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Emulgator (**Sojalecithin**), Natriumchlorid, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Acesulfam K, Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, Farbstoffe: Carotin, Betenrot, Nicotinamid, Eisensulfat, Zinkgluconat, DL-Alpha-Tocopherylacetat, D-Calciumpantothenat, Mangangluconat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Kupfergluconat, Retinylacetat, Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure), Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Phyllochinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Mindestens haltbar bis Ende / Chargen-Nr.: } **siehe Seite der Box**

Page 3

Height - 120mm

Διατροφικές Πληροφορίες / Informazioni nutrizionali / Voedingswaarde / Nährwertangaben / Informação Nutricional /Beslenme Bilgisi

GR	IT	NL/BE	PT	TR		ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ / GUSTO NEUTRO / NIET-GEAROMATISEERD / SABOR NEUTRO / NEUTRAL SMAK / AROMASIZ 100g	24g	ΜΕ ΓΕΥΣΗ / AROMATIZZATI / FLAVOURED / GEAROMATISEERD / AROMALI 100g	24g
Ενέργεια	Energia	Energie	Valor Energético	Enerji	kJ	1440	346	1341	322
					kcal	339	81	316	76
Λίπη	Grassi	Vetten	Lípidos	Toplam yağ	g	0.05	0.02	0.05	0.02
εκ των οποίων κορεσμένα	di cui acidi grassi saturi	waarvan verzadigde	Dos quais Saturados	Doymuş yağ	g	0	0	0	0
Υδατάνθρακες	Carboidrati	Koolhydraten	Hidratos de Carbono	Karbonhidrat	g	42.9	10.3	37.1	8.9
εκ των οποίων σάκχαρα	di cui zuccheri	waarvan suikers	dos quais Açúcares	Şeker	g	27.1	6.5	20	4.8
Ισοδύναμο πρωτεΐνης	Proteine equivalenti	Eiwitequivalent	Equivalente proteico	Protein eşdeğeri	g	41.7	10	41.7	10
L-φαινυλαλανίνη	L-Fenilalanina	L-Fenylalanine	L-Fenilalanina	L-Fenilalanin	g	0	0	0	0
Αλάτι	Sale	Zout	Sal	Tuz	g	0.95	0.23	0.95	0.23
Βιταμίνες / Μέταλλα	**Vitamine / Minerali**	**Vitamines / Mineralen**	**Vitaminas / Minerais**	**Vitaminler / Mineraller**					
Βιταμίνη A (RE)	Vitamina A (RE)	Vitamine A (RE)	Vitamina A (RE)	Vitamin A (RE)	µg	600	144	600	144
Βιταμίνη D	Vitamina D	Vitamine D	Vitamina D	Vitamin D	µg	14.6	3.5	14.6	3.5
Βιταμίνη E (αTE)	Vitamina E (αTE)	Vitamine E (αTE)	Vitamina E (αTE)	Vitamin E (αTE)	mg	9.0	2.2	9.0	2.2
Βιταμίνη K	Vitamina K	Vitamine K	Vitamina K	Vitamin K	µg	41	9.8	41	9.8
Βιταμίνη C	Vitamina C	Vitamine C	Vitamina C	Vitamin C	mg	63	15	63	15
Θειαμίνη	Tiammina	Thiamine	Tiamina	Tiyamin	mg	1.0	0.24	1.0	0.24
Ριβοφλαβίνη	Riboflavina	Riboflavine	Riboflavina	Riboflavin	mg	1.2	0.29	1.2	0.29
Βιταμίνη B6	Vitamina B6	Vitamine B6	Vitamina B6	Vitamin B6	mg	1.1	0.26	1.1	0.26
Νιασίνη	Niacina	Niacine	Niacina	Niyasin	mg (mg NE)	14 (30.7)	3.4 (7.4)	14 (30.7)	3.4 (7.4)

Page 24 - 145mm

ES

ALIMENTO PARA USOS MÉDICOS ESPECIALES

PKU Gel es un sustituto proteico en forma de polvo, exento de fenilalanina, disponible en tres versiones: sabor naranja, frambuesa y no saborizado.
Contiene una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales, carbohidratos, vitaminas, minerales, oligoelementos. Para el manejo dietético de pacientes con Fenilcetonuria (PKU).
Las versiones saborizadas contienen edulcorantes.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Dosis a determinar por el médico o dietista y en función de la edad, peso y condiciones médicas del paciente.

Instrucciones de preparación
Preparar en el momento y usar inmediatamente. Si fuera necesario guardar en refrigerador y usar en las 24 horas siguientes, volver a agitar antes de usar.
IMPORTANTE - Debe tomarse agua u otras bebidas permitidas después del PKU Gel.

Sugerencias para saborizar
Añadir al producto saborizantes permitidos y seguir los pasos que se muestran en las instrucciones de preparación.

Aviso Importante
Sólo debe ser consumido por personas diagnosticadas de Fenilcetonuria (PKU).
Sólo debe ser usado bajo estricta supervisión médica.
La versión no saborizada esta indicada desde los 6 meses hasta los 10 años de edad. Las versiones saborizadas estan indicadas desde 3 años hasta 10 años de edad.
Este producto debe ser complementado con proteína natural, y otros nutrientes en las cantidades prescritas para proporcionar la fenilalanina esencial y alcanzar los requerimientos nutricionales generales.
No es adecuado como única fuente de alimento.
No utilizar por vía parenteral.

Almacenamiento
Guardar en un lugar fresco y seco.
Los sobres están diseñados para un solo uso.
Una vez abierto, si no se utiliza todo el polvo, guardar en refrigerador y consumir en las 24 horas siguientes.

Ingredientes
PKU Gel no saborizado
Azúcar, Almidón, L-Lisina - L aspartato, Almidón modificado, L-Leucina, L-Tirosina, L-Glicina, L-Arginina - L-aspartato, L-Valina, L-Glutamina, L-Prolina, L-Treonina, L-Isoleucina, Tricálcico fosfato, L-Serina, L-Alanina, L-Histidina, Citrato tripotásico, Hidrógeno Fosfato de Magnesio, L-Cistina, Citrato trisódico, L-Triptófano, Cloruro de potasio, L-Metionina, L-Arginina, Jarabe de glucosa deshidratado, Cloruro de sodio, Taurina, Gluconato ferroso, Gluconato de zinc, tartrato de carnitina, ácido L-ascórbico, Gluconato de manganeso, nicotinamida, Acetato de retinilo, DL-alfa tocoferol acetato, gluconato de cobre, vitamina D2, D-Pantotenato de Calcio, Clorhidrato de piridoxina, Riboflavina, Clorhidrato de tiamina, Vitamina K1, Cloruro de cromo, Yoduro de potasio, Ácido fólico, Molibdato de amonio, Selenito de sodio, D-Biotina, Cianocobalamina.
PKU Gel Frambuesa
Sacarosa, Almidón, L-Lisina L-aspartato, Almidón modificado, L-Leucina, L-Tirosina, L-Glicina, L-Arginina L-aspartato, L-Valina, L-Glutamina, L-Prolina, L-Treonina,L-Isoleucina, Fosfato Tricálcico, L-Serina, Calcio Glicerofosfato, L-Alanina, L-Histidina, Citrato trisódico, Hidrógeno fosfato de Magnesio, Citrato tripotasico, L-Cistina, cloruro de potasio, regulador de la acidez (E296), L-Triptófano, L-Metionina, Bitartrato de Colina, L-Arginina, Aromatizantes, Colorante (E162), Maltodextrina, Cloruro de sodio, Ácido L-ascórbico, Taurina, Edulcorante artificial (Acesulfame K), L-Carnitina L-Tartrato, Nicotinamida, Sulfato ferroso, Gluconato de zinc, Acetato de DL-alfa-tocoferil, D-pantotenato de calcio, Gluconato de manganeso, Riboflavina, Clorhidrato de piridoxina, Clorhidrato de Tiamina, Gluconato de cobre, Acetato de retinilo, Ácido fólico (ácido Pteroilmonoglutámico), Yoduro de potasio, Cloruro de cromo, Molibdato de sodio, Vitamina K(filoquinona), Selenito Sódico, D-biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamina B12 (cianocobalamina).
PKU Gel Naranja
Sacarosa, Almidón, L-Lisina L-aspartato, almidón Modificado, L-Leucina, L-Tirosina, L-Glicina, L-Arginina L-aspartato, L-Valina, L-Glutamina, L-Prolina, L-Treonina,L-Isoleucina, regulador de la acidez (E330), Fosfato Tricálcico, L-Serina, Glicerofosfato de calcio, L-alanina, L-Histidina, Citrato Trisódico, Hidrógeno Fosfato de Magnesio, Aromatizantes, Citrato Tripotásico, L-Cistina, Cloruro Potásico, L-Triptófano, L-Metionina, Bitartrato de colina, L-Arginina, Maltodextrina, Emulgente (Lecitina de **Soja**), Cloruro de sodio, Ácido L-ascórbico, Edulcorante artificial (Acesulfame K), Taurina, L-Carnitina L-Tartrato, Colores (E160a, E162), Nicotinamida, Sulfato Ferroso, Gluconato de zinc, Acetato de DL-alfa-tocoferil, D-Pantotenato de Calcio, Gluconato de Manganeso, Riboflavina, Clorhidrato de piridoxina, Clorhidrato de tiamina, Gluconato de cobre, Acetato de Retinilo, Ácido fólico (Ácido Pteroilmonoglutámico), Yoduro de potasio, Cloruro de cromo, Molibdato de sodio, Vitamina K (Filoquinona), Selenito Sódico, D-Biotina, Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina).

Consumir preferentemente antes del fin de / Lote Nº: } **Ver el lateral del envase**

Page 5 - 145mm

FR BE

DENRÉE ALIMENTAIRE DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES

Pour les besoins nutritionnels en cas de phénylcétonurie (PCU).
PKU gel est un substitut de protéine exempt de phénylalanine pour les besoins nutritionnels en cas de phénylcétonurie et contenant un mélange d'acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, des vitamines et des minéraux.
Il est proposé en versions non aromatisée et aromatisées (orange et framboise). Les versions aromatisées contiennent un édulcorant.

Dosage
À déterminer par le prescripteur en fonction de l'âge, du poids corporel et de la situation médicale du patient.

Préparation
PKU gel peut être reconstitué sous forme d'entremet ou de boisson, à donner à la cuillère ou au verre (voir boîte).
La version non aromatisée peut être parfumée, si désiré, avec les sachets d'arôme FlavourPac de Vitaflo (cassis, citron, framboise, orange, tropical)
Il est préférable de consommer PKU gel immédiatement après sa préparation.
Il est fortement recommandé de boire de l'eau après chaque prise.

AVIS IMPORTANT
Pour patients atteints de Phénylcétonurie.
PKU gel non aromatisé: pour les enfants à partir de 6 mois jusqu'à 10 ans/ PKU gel aromatisé: pour les enfants à partir de 1 ans jusqu'à 10 ans.
Utiliser sous contrôle médical.
Ne peut constituer la seule source d'alimentation.
Ne pas utiliser par voie parentérale.

Conservation
Conserver dans un endroit frais et sec. Tout sachet ouvert doit être conservé au réfrigérateur soigneusement refermé à l'aide d'un clip et consommé dans les 24 heures.

Ingrédients
PKU gel non aromatisé
saccharose, amidon, L-aspartate de L-lysine, amidon modifié, L-leucine, L-tyrosine, glycine, L-aspartate de L-arginine, L-valine, L-glutamine, L-proline, L-thréonine, L-isoleucine, phosphate tricalcique, L-sérine, glycérophosphate de calcium, L-alanine, L-histidine, citrate trisodique, hydrogénophosphate de magnésium, citrate tripotassique, L-cystine, chlorure de potassium, L-tryptophane, L-méthionine, bitartrate de choline, L-arginine, maltodextrine, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, taurine, L-tartrate de L-carnitine, nicotinamide, sulfate de fer, gluconate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, gluconate de manganèse, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, gluconate de cuivre, acétate de rétinol, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, sélénite de sodium, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
PKU gel framboise
saccharose, amidon, L-aspartate de L-lysine, amidon modifié, L-leucine, L-tyrosine, glycine, L-aspartate de L-arginine, L-valine, L-glutamine, L-proline, L-thréonine, L-isoleucine, phosphate tricalcique, L-sérine, glycérophosphate de calcium, L-alanine, L-histidine, citrate trisodique, hydrogénophosphate de magnésium, citrate tripotassique, L-cystine, chlorure de potassium, régulateur d'acidité (acide malique), L-tryptophane, L-méthionine, bitartrate de choline, L-arginine, arôme, colorant (rouge de betterave), maltodextrine, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, taurine, édulcorant (acésulfame K), L-tartrate de L-carnitine, nicotinamide, sulfate de fer, gluconate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, gluconate de manganèse, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, gluconate de cuivre, acétate de rétinol, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, vitamine k (phylloquinone), sélénite de sodium, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.
PKU Gel orange
saccharose, amidon, L-aspartate de L-lysine, amidon modifié, L-leucine, L-tyrosine, glycine, L-aspartate de L-arginine, L-valine, L-glutamine, L-proline, L-thréonine, L-isoleucine, régulateur d'acidité (acide citrique), phosphate tricalcique, L-sérine, glycérophosphate de calcium, L-alanine, L-histidine, citrate trisodique, hydrogénophosphate de magnésium, arôme, citrate tripotassique, L-cystine, chlorure de potassium, L-tryptophane, L-méthionine, bitartrate de choline, L-arginine, maltodextrine, émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de sodium, acide L-ascorbique, édulcorant (acésulfame K), taurine, L-tartrate de L-carnitine, colorants (bêta-carotène, rouge de betterave), nicotinamide, sulfate de fer, gluconate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, gluconate de manganèse, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, gluconate de cuivre, acétate de rétinyl, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, sélénite de sodium, D-biotine, cholécalciférol, vitamine b12 (cyanocobalamine).

A consommer de préférence avant fin / N° de lot } **voir sur le côté de la boîte**

Page 6

Nutritional Information / Nährwertangaben / Næringsdeklaration / Näringsvärde / Información Nutricional / Informations nutritionnelles

EN	DE/AT	DK/NO/SE	ES	FR/BE		UNFLAVOURED / GESCHMACKSNEUTRAL / NØYTRAL / NEUTRAL / NON AROMATISÉ 100g	24g	FLAVOURED / MIT GESCHMACK / SMAG / SMAKSATT / INFORMACIÓN / NUTRICIONAL / PRÉ-AROMATISÉ 100g	24g
Folic acid (Folate)	Folsäure	Folsyre/Folsyra (folat)	Ácido fólico (Folato)	Acide folique (folate)	µg	208 (347)	50 (83)	208 (347)	50 (83)
Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamin B12	Vitamina B12	Vitamine B12	µg	2.0	0.48	2.0	0.48
Pantothenic acid	Pantothensäure	Pantothensyre/ Pantotensyra	Ácido pantoténico	Acide pantothénique	mg	5.0	1.2	5.0	1.2
Biotin	Biotin	Biotin	Biotina	Biotine	µg	25	6.0	25	6.0
Sodium	Natrium	Natrium	Sodio	Sodium	mg	379	91	379	91
					mmol	16.3	3.9	16.3	3.9
Chloride	Chlorid	Chlorid/Klorid	Cloro	Chlore	mg	583	140	583	140
					mmol	16.3	3.9	16.3	3.9
Potassium	Kalium	Kalium	Potasio	Potassium	mg	938	225	938	225
					mmol	23.5	5.6	23.5	5.6
Calcium	Calcium	Calcium/Kalcium	Calcio	Calcium	mg	1083	260	1083	260
					mmol	27.1	6.5	27.1	6.5
Phosphorus	Phosphor	Fosfor	Fósforo	Phosphore	mg	825	198	825	198
					mmol	26.4	6.3	26.4	6.3
Magnesium	Magnesium	Magnesium	Magnesio	Magnésium	mg	167	40	167	40
					mmol	6.8	1.6	6.8	1.6
Iron	Eisen	Jern/Järn	Hierro	Fer	mg	14	3.4	14	3.4
Zinc	Zink	Zink	Zinc	Zinc	mg	11	2.6	11	2.6
Copper	Kupfer	Kobber/Koppar	Cobre	Cuivre	mg	0.80	0.19	0.80	0.19
Iodine	Jod	Jod	Iodo	Iode	µg	138	33.1	138	33.1
Selenium	Selen	Selen	Selenio	Sélénium	µg	35	8.4	35	8.4
Manganese	Mangan	Mangan	Manganeso	Manganèse	mg	1.7	0.41	1.7	0.41
Chromium	Chrom	Chrom	Cromo	Chrome	µg	71	17	71	17
Molybdenum	Molybdän	Molybdæn/Molybden	Molibdeno	Molybdène	µg	50	12	50	12
Choline	Cholin	Cholin/Kolin	Colina	Choline	mg	279	67	279	67

Osmolality/Osmolalität/Osmolalitet/Osmolalidad/Osmolalité: 24g + 30ml = 3000 mOsm/kg / 24g + 80ml = 1540 mOsm/kg
Osmolarität 24g + 80ml = 853mOsm/l

Page 23

Height - 120mm

IT

ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI

PKU gel è un sostituto proteico in polvere privo di fenilalanina, con aminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, vitamine, minerali e oligoelementi. Per la gestione dietetica della fenilchetonuria. Disponibile nei gusti neutro, arancia o lampone. I gusti arancia e lampone contengono edulcorante.

Dosaggio
Secondo indicazione medica, tenendo conto dell'età, del peso e delle condizioni cliniche del paziente.

Modalità d'uso
Per risultati ottimali si consiglia di consumare il prodotto al momento della ricostituzione. Se necessario, il prodotto va conservato in frigorifero e consumato entro 24 ore, agitando bene prima del consumo.
Si consiglia di bere acqua o altri liquidi permessi dopo l'assunzione.

Avvertenze importanti
Usare sotto controllo medico.
Non adatto come unica fonte di nutrimento.
Deve essere consumato solo da pazienti con provata fenilchetonuria.
Il gusto neutro è adatto dai 6 mesi ai 10 anni di età. I gusti lampone e arancia sono adatti da 1 anno a 10 anni di età.
La dieta deve essere completata con proteine naturali, acqua ed altri nutrienti nelle quantità prescritte per fornire fenilalanina, fluidi e soddisfare il generale fabbisogno nutrizionale, secondo indicazione medica.
Solo per uso enterale.

Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Le bustine sono monouso, la polvere non utilizzata deve essere conservata in frigo e consumata entro 24 ore.

Ingredienti
Gusto neutro
Zucchero, amido, L-lisina-L-aspartato, amido modificato, L-leucina, L-tirosina, glicina, L-arginina-L-aspartato, L-valina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-isoleucina, fosfato tricalcico, L-serina, glicerofosfato di calcio, L-alanina, L-istidina, citrato di sodio, idrogenofosfato di magnesio, citrato di potassio, L-cistina, cloruro di potassio, L-triptofano, L-metionina, bitartrato di colina, L-arginina, maltodestrine, cloruro di sodio, acido L-ascorbico, taurina, L-carnitina-L-tartrato, nicotinamide, solfato ferroso, gluconato di zinco, acetato di DL-alfa-tocoferile, D-pantotenato di calcio, gluconato di manganese, riboflavina, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, gluconato di rame, acetato di retinile, acido folico (acido pteroilmonoglutammico), ioduro di potassio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, vitamina K (fillochinone), selenito di sodio, D-biotina, vitamina D (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
Gusto lampone
Zucchero, amido, L-lisina-L-aspartato, amido modificato, L-leucina, L-tirosina, glicina, L-arginina-L-aspartato, L-valina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-isoleucina, fosfato tricalcico, L-serina, glicerofosfato di calcio, L-alanina, L-istidina, citrato di sodio, idrogenofosfato di magnesio, citrato di potassio, L-cistina, cloruro di potassio, correttore di acidità (E296), L-triptofano, L-metionina, bitartrato di colina, L-arginina, aromi, colorante (E162), maltodestrine, cloruro di sodio, acido L-ascorbico, taurina, edulcorante (Acesulfame K), L-carnitina-L-tartrato, nicotinamide, solfato ferroso, gluconato di zinco, acetato di DL-alfa-tocoferile, D-pantotenato di calcio, gluconato di manganese, riboflavina, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, gluconato di rame, acetato di retinile, acido folico (acido pteroilmonoglutammico), ioduro di potassio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, vitamina K (fillochinone), selenito di sodio, D-biotina, vitamina D (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
Gusto arancia
Zucchero, amido, L-lisina-L-aspartato, amido modificato, L-leucina, L-tirosina, glicina, L-arginina-L-aspartato, L-valina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-isoleucina, correttore di acidità (E330), fosfato tricalcico, L-serina, glicerofosfato di calcio, L-alanina, L-istidina, citrato di sodio, idrogenofosfato di magnesio, aromi, citrato di potassio, L-cistina, cloruro di potassio, L-triptofano, L-metionina, bitartrato di colina, L-arginina, maltodestrine, emulsionante (lecitine di **soia**), cloruro di sodio, acido L-ascorbico, edulcorante (Acesulfame K), taurina, L-carnitina-L-tartrato, coloranti (E160a, E162), nicotinamide, solfato ferroso, gluconato di zinco, acetato di DL-alfa-tocoferile, D-pantotenato di calcio, gluconato di manganese, riboflavina, cloridrato di piridossina, cloridrato di tiamina, gluconato di rame, acetato di retinile, acido folico (acido pteroilmonoglutammico), ioduro di potassio, cloruro di cromo, molibdato di sodio, vitamina K (fillochinone), selenito di sodio, D-biotina, vitamina D (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).

Da consumarsi preferibilmente entro fine: / Lotto n.: vedi lato

Page 8 - 145mm

Οδηγίες Προετοιμασίας / Istruzioni di preparazione / Utilização / Kullanım Talimatları / Návod k přípravě / Návod na prípravu / Felhasználási útmutató / Sposób przygotowania

ΓΙΑ ΡΟΦΗΜΑ / PER PREPARARE UNA BEVANDA / PARA BEBIDA / İÇECEK İÇİN / NÁPOJ / NÁPOJ / ITAL ELKÉSZÍTÉSÉHEZ / ABY OTRZYMAĆ NAPÓJ:



		1	2	3
Ή	GR	Αδειάστε το περιεχόμενο του φακελίσκου στο σέικερ.	Προσθέστε περίπου 80ml κρύο νερό. Κλείστε το καπάκι και ανακινήστε καλά για 10 δευτερόλεπτα.	Πιείτε το αμέσως.
o	IT	Versa il contenuto di una busta in un bicchiere.	Aggiungi circa 80 ml di acqua fredda e mescola bene per 10 secondi.	Bevi immediatamente.
ou	PT	Num recipiente junte o conteúdo de uma carteira de sabores se desejado.	Adicionar aproximadamente 80 ml de água fria. Tapar e agitar bem durante 10 segundos.	Beber em seguida.
Veya	TR	Saşe içeriğini bir karıştırıcıya boşaltın.	Yaklaşık 80 ml soğuk su ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve 10 saniye süre ile iyice çalkalayın.	Hemen için.
Nápoj	CZ	Vysypte obsah sáčku (případně i 1/2 - 1 sáčku Flavour Pack) do nádoby s víčkem.	Přidejte přibližně 80 ml studené vody. Přiklopte nádobku víčkem a dobře protřepejte po dobu 10 vteřin.	Ihned vypijte.
Nápoj	SK	Vyprázdnite obsah vrecka (prípadne aj 1/2 - 1 FlavourPac vrecko) do nádoby s vekom.	Pridajte približne 80 ml studenej vody. Zaistite veko a dobre potrepte počas 10 sekúnd.	Ihneď vypite.
vagy	HU	Öntse a tasak tartalmát egy fedeles pohárba.	Adjon hozzá kb. 80 ml hideg vizet. Tegye rá a fedelet és jól rázza össze 10 másodpercig.	Elkészítés után azonnal fogyasztandó.
lub	PL	Wsypać zawartość saszetki do naczynia.	Dodać około 80 ml chłodnej wody. Zamknąć szczelnie naczynie i dobrze wymieszać przez 10 sekund.	Wypić natychmiast po przygotowaniu.

Νερό ή επιτρεπόμενα ροφήματα να καταναλωθούν μετά τη χρήση του PKU Gel / Si consiglia di bere acqua o altri liquidi permessi dopo l'assunzione di PKU gel. / Água ou outras bebidas permitidas devem ser bebidas depois do PKU Gel / Su veya diğer izin verilen içecekler PKU Gel'den sonra tüketilmelidir / Vodu či jiné povolené nápoje můžete pít po konzumaci PKU Gel / PKU Gel je po požití vhodné zapiť vodou alebo inými povolenými nápojmi. / A PKU Gel elfogyasztása után igyon vizet vagy egyéb megengedett italt / Wskazane jest spożycie wody lub innych dozwolonych napojów po przyjęciu PKU Gel

Page 21 - 145mm

Nutritional Information / Nährwertangaben / Næringsdeklaration / Näringsvärde / Información Nutricional / Informations nutritionnelles

EN	DE/AT	DK/NO/SE	ES	FR/BE		UNFLAVOURED / GESCHMACKSNEUTRAL / NØYTRAL / NEUTRAL / NON AROMATISÉ 100g	24g	FLAVOURED / MIT GESCHMACK / SMAG / SMAKSATT / INFORMACIÓN / NUTRICIONAL / PRÉ-AROMATISÉ 100g	24g
Energy	Brennwert/Energie	Energi	Energía	Energie	kJ	1440	346	1341	322
					kcal	339	81	316	76
Fat	Fett	Fedt/Fett	Lípidos	Lipides					
		heraf mættet fedt							
of which	davon	hvorav mettet fett			g	0.05	0.02	0.05	0.02
saturates	gesättigte Fettsäuren	varav mättat fett	Saturadas	dont saturés	g	0	0	0	0
Carbohydrate	Kohlenhydrate	Kulhydrat/ Karbohydrater/ Kolhydrater	Carbohidratos	Glucides	g	42.9	10.3	37.1	8.9
of which sugars	davon Zucker	heraf/hvorav sukkerarter/ varav sockerarter	de los cuales azúcares	dont sucres	g	27.1	6.5	20	4.8
Protein equivalent	Eiweiß	Protein ækvivalent/ekvivalent	Equivalente Proteína	Equivalent protidique	g	41.7	10	41.7	10
L-Phenylalanine	L-Phenylalanin	L-Fenylalanin	L-Phenylalanine	L-Phénylalanine	g	0	0	0	0
Salt	Salz	Salt	Sal	Sel	g	0.95	0.23	0.95	0.23
Vitamins/minerals	**Vitamine/Mineralstoffe**	**Vitaminer/Mineraler**	**Vitaminas/Minerales**	**Vitamines/Minéraux**					
Vitamin A (RE)	Vitamin A (RE)	Vitamin A (RE)	Vitamina A (RE)	Vitamine A (RE)	µg	600	144	600	144
Vitamin D	Vitamin D	Vitamin D	Vitamina D	Vitamine D	µg	14.6	3.5	14.6	3.5
Vitamin E (αTE)	Vitamin E (αTE)	Vitamin E (αTE)	Vitamina E (αTE)	Vitamine E (αTE)	mg	9.0	2.2	9.0	2.2
Vitamin K	Vitamin K	Vitamin K	Vitamina K	Vitamine K	µg	41	9.8	41	9.8
Vitamin C	Vitamin C	Vitamin C	Vitamina C	Vitamine C	mg	63	15	63	15
Thiamin	Thiamin	Thiamin	Tiamina	Thiamine	mg	1.0	0.24	1.0	0.24
Riboflavin	Riboflavin	Riboflavin B2	Riboflavina	Riboflavine	mg	1.2	0.29	1.2	0.29
Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamin B6	Vitamina B6	Vitamine B6	mg	1.1	0.26	1.1	0.26
Niacin	Niacin	Niacin	Niacina	Niacine	mg (NE)	14 (30.7)	3.4 (7.4)	14 (30.7)	3.4 (7.4)

Page 22

GR

ΤΡΟΦΙΜΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Το PKU Gel είναι ένα υποκατάστατο πρωτεΐνης χωρίς φαινυλαλανίνη σε σκόνη, διατίθεται σε ουδέτερη γεύση και επιλογές γεύσης πορτοκάλι και βατόμουρο και περιέχει απαραίτητα και μη απαραίτητα αμινοξέα, υδατάνθρακες, σάκχαρα, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Για τη διαιτητική αντιμετώπιση της Φαινυλκετονουρίας (PKU).
Προϊόντα με γεύση που περιέχουν σάκχαρα και γλυκαντική ουσία.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Καθορίζεται από τον ιατρό ή το διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Για καλύτερα αποτελέσματα το προϊόν θα πρέπει να προετοιμάζεται και έπειτα να καταναλώνεται άμεσα, εάν είναι δυνατόν.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Νερό ή επιτρεπόμενα ροφήματα θα πρέπει να καταναλωθούν μετά τη χρήση του gel ή του ροφήματος.

ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το ουδέτερης γεύσης προϊόν μπορεί να αποκτήσει γεύση φραγκοστάφυλο, λεμόνι, πορτοκάλι, βατόμουρο ή τροπικά φρούτα με χρήση των βελτιωτικών γεύσης σε φακελάκια της Vitaflo. Απλά προσθέστε 1/2 ή 1 φακελάκι στο ουδέτερης γεύσης προϊόν και προετοιμάστε σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Προς κατανάλωση μόνο από παιδιά με διεγνωσμένη φαινυλκετονουρία (PKU) υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη.
- Ουδέτερης γεύσης προϊόν κατάλληλο για βρέφη από 6 μηνών έως παιδιά 10 ετών.
- Προϊόν με επιλογή γεύσης κατάλληλο για παιδιά από 1 έως 10 ετών.
- Η δίαιτα θα πρέπει να συμπληρώνεται με φυσική πρωτεΐνη, νερό και άλλα θρεπτικά συστατικά σε καθορισμένες ποσότητες σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού ή του διαιτολόγου, για την κάλυψη των αναγκών σε φαινυλαλανίνη, σε υγρά αλλά και των γενικότερων διατροφικών αναγκών.
- Δεν ενδείκνυται ως αποκλειστική πηγή διατροφής.
- Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση.

ΦΥΛΑΞΗ:
Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος. Τα φακελάκια είναι σχεδιασμένα για μια χρήση και η ποσοότητα της σκόνης η οποία δεν έχει καταναλωθεί θα πρέπει να φυλαχθεί σε ψυγείο και να καταναλωθεί εντός 24 ωρών.

Συστατικά:
PKU Gel ουδέτερη γεύση
Σακχαρόζη , Άμυλο, L-Ασπαρτική L-Λυσίνη, Τροποποιημένο άμυλο, L-Λευκίνη, L-Τυροσίνη, Γλυκίνη, L-Ασπαρτική L-Αργινίνη, L-Βαλίνη, L-Γλουταμίνη, L-Προλίνη, L-Θρεονίνη, L-Ισολευκίνη, Φωσφορικό ασβέστιο, L-Σερίνη, Γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο, L-Αλανίνη, L-Ιστιδίνη, Κιτρικό τρινάτριο, Όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, Κιτρικό τρικάλιο, L-Κυστίνη, Χλωριούχο κάλιο, L-Τρυπτοφάνη, L-Μεθειονίνη, Διτρυγική χολίνη, L-Αργινίνη, Μαλτοδεξτρίνη, Χλωριούχο νάτριο, L-Ασκορβικό οξύ, Ταυρίνη, L-Τρυγική L-Καρνιτίνη, Νικοτιναμίδιο, Θειικός σίδηρος, Γλυκονικός ψευδάργυρος, Οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, D-Παντοθενικό ασβέστιο, Γλυκονικό μαγγάνιο, Ριβοφλαβίνη, Υδροχλωρική πυριδοξίνη, Υδροχλωρική θειαμίνη, Γλυκονικός χαλκός, Οξική ρετινόλη, Φυλλικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ), Ιωδιούχο κάλιο, Χλωριούχο χρώμιο, Μολυβδαινικό νάτριο, Βιταμίνη K (φυλλοκινόνη), Σεληνιώδες νάτριο, D-Βιοτίνη, Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη), Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη).
PKU Gel Πορτοκάλι
Σακχαρόζη, Άμυλο, L-Ασπαρτική L-Λυσίνη, Τροποποιημένο άμυλο, L-Λευκίνη, L-Τυροσίνη, Γλυκίνη, L-Ασπαρτική L-Αργινίνη, L-Βαλίνη, L-Γλουταμίνη, L-Προλίνη, L-Θρεονίνη, L-Ισολευκίνη, Ρυθμιστής οξύτητας (E330), Φωσφορικό ασβέστιο, L-Σερίνη, Γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο, L-Αλανίνη, L-Ιστιδίνη, Κιτρικό τρινάτριο, Όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, Αρωματικές ύλες, Κιτρικό τρικάλιο, L-Κυστίνη, Χλωριούχο κάλιο, L-Τρυπτοφάνη, L-Μεθειονίνη, Διτρυγική χολίνη, L-Αργινίνη, Μαλτοδεξτρίνη, Γαλακτωματοποιητής (Λεκιθίνη **σόγιας**), Χλωριούχο Νάτριο, L-Ασκορβικό οξύ, Τεχνητή γλυκαντική ουσία (Ακεσουλφάμη K), Ταυρίνη, L-Τρυγική L-Καρνιτίνη, Χρωστικές ουσίες (E160a,E162), Νικοτιναμίδιο, Θεϊικός σίδηρος, Γλυκονικός ψευδάργυρος, Οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, D-Παντοθενικό ασβέστιο, Γλυκονικό μαγγάνιο, Ριβοφλαβίνη, Υδροχλωρική πυριδοξίνη, Υδροχλωρική θειαμίνη, Γλυκονικός χαλκός, Οξική ρετινόλη, Φυλλικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ), Ιωδιούχο κάλιο, Χλωριούχο χρώμιο, Μολυβδαινικό νάτριο, Βιταμίνη K (φυλλοκινόνη), Σεληνιώδες νάτριο, D-Βιοτίνη, Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη), Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη).
PKU Gel Βατόμουρο
Σακχαρόζη, Άμυλο, L-Ασπαρτική L-Λυσίνη, Τροποποιημένο άμυλο, L-Λευκίνη, L-Τυροσίνη, Γλυκίνη, L-Ασπαρτική L-Αργινίνη, L-Βαλίνη, L-Γλουταμίνη, L-Προλίνη, L-Θρεονίνη, L-Ισολευκίνη, Φωσφορικό ασβέστιο, L-Σερίνη, Γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο, L-Αλανίνη, L-Ιστιδίνη, Κιτρικό τρινάτριο, Όξινο φωσφορικό μαγνήσιο, Κιτρικό τρικάλιο, L-Κυστίνη, Χλωριούχο κάλιο, Ρυθμιστής οξύτητας (E296), L-Τρυπτοφάνη, L-Μεθειονίνη, Διτρυγική χολίνη, L-Αργινίνη, Αρωματικές ύλες, Χρωστική ουσία (E162), Μαλτοδεξτρίνη, Χλωριούχο νάτριο, L-Ασκορβικό οξύ, Ταυρίνη, Τεχνητή γλυκαντική ουσία (Ακεσουλφάμη K), L-Τρυγική L-Καρνιτίνη, Νικοτιναμίδιο, Θειικός σίδηρος, Γλυκονικός ψευδάργυρος, Οξική DL-άλφα-τοκοφερόλη, D-Παντοθενικό ασβέστιο, Γλυκονικό μαγγάνιο, Ριβοφλαβίνη, Υδροχλωρική πυριδοξίνη, Υδροχλωρική θειαμίνη, Γλυκονικός χαλκός, Οξική ρετινόλη, Φυλλικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ), Ιωδιούχο κάλιο, Χλωριούχο χρώμιο, Μολυβδαινικό νάτριο, Βιταμίνη K (φυλλοκινόνη), Σεληνιώδες νάτριο, D-Βιοτίνη, Βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη), Βιταμίνη B12 (κυανοκοβαλαμίνη).

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 92482/30-12-2011

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος / Αριθμός Παρτίδας : Βλέπε στην πλαϊνή πλευρά της συσκευασίας

Page 7

Height - 120mm

Οδηγίες Προετοιμασίας / Istruzioni di preparazione / Utilização / Kullanım Talimatları / Návod k přípravě / Návod na prípravu / Felhasználási útmutató / Sposób przygotowania

ΓΙΑ GEL / PER PREPARARE UN GEL / PARA OBTER GEL / JEL İÇİN / GEL / GÉL KÉSZÍTÉSÉHEZ / ABY OTRZYMAĆ ŻEL / GÉL:



	1	2	3
GR	Αδειάστε το περιεχόμενο του φακελίσκου στο σέικερ.	Προσθέστε 30ml κρύο νερό, κλείστε το καπάκι και ανακινήστε καλά για 10 δευτερόλεπτα.	Περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί το gel. Καταναλώστε το με κουτάλι.
IT	Versa il contenuto di una busta in un bicchiere.	Aggiungi 30 ml di acqua fredda. Mescola bene per 10 secondi.	Lascia riposare per 2 minuti finché non si forma un gel omogeneo. Si consiglia di assumere con un cucchiaio.
PT	Num recipiente junte o conteúdo de uma saqueta com o de uma carteira de sabores se desejado.	Adicionar 30 ml de água fria. Tapar e agitar bem durante 10 segundos.	Deixe repousar 2 minutos permitindo a formação de um gel suave. Consumir à colher.
TR	Saşe içeriğini bir karıştırıcıya boşaltın.	Yaklaşık 30ml soğuk su ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve 10 saniye süreyle iyice çalkalayın.	Pürüzsüz jel oluşana kadar 2 dakika süreyle bekletin ve kaşık ile tüketin.
CZ	Vysypte obsah sáčku (případně i 1/2 - 1 sáčku Flavour Pack) do nádoby s víčkem.	Přidejte 30 ml studené vody. Přiklopte nádobku víčkem a dobře protřepejte po dobu 10 vteřin.	Ponechte 2 minuty odstát, než se vytvoří hladký gel. Konzumujte lžičkou.
SK	Vyprázdnite obsah vrecka (prípadne aj 1/2 - 1 FlavourPac vrecko) do nádoby s vekom.	Pridajte 30 ml studenej vody. Zaistite veko a dobre potrepte počas 10 sekúnd.	Nechajte postáť 2 minúty, než sa vytvorí hladký gél. Konzumujte lyžičkou.
HU	Öntse a tasak tartalmát egy fedeles pohárba.	Adjon hozzá 30 ml hideg vizet. Tegye rá a fedelet és jól rázza össze 10 másodpercig .	A géles állag elérése érdekében hagyja állni 2 percig. Kanállal fogyasztandó.
PL	Wsypać zawartość saszetki .	Dodać około 30 ml chłodnej wody. Zamknąć szczelnie naczynie i dobrze wymieszać przez 10 sekund.	Odstawić na 2 minuty, aby powstał gładki żel. Spożywać łyżeczką.

Νερό ή επιτρεπόμενα ροφήματα να καταναλωθούν μετά τη χρήση του PKU Gel / Água ou outras bebidas permitidas devem ser bebidas depois do PKU Gel / Su veya diğer izin verilen içecekler PKU Gel'den sonra tüketilmelidir / Vodu či jiné povolené nápoje můžete pít po konzumaci PKU Gel / PKU Gel je po požití vhodné zapiť vodou alebo inými povolenými nápojmi. / A PKU Gel elfogyasztása után igyon vizet vagy egyéb megengedett italt / Wskazane jest spożycie wody lub innych dozwolonych napojów po przyjęciu PKU Gel.

Page 20 - 145mm

NL BE

VOEDING VOOR MEDISCH GEBRUIK

Dieetvoeding bij Fenylketonurie (PKU).
PKU gel is een poedervormige eiwitvervanger vrij van fenylalanine voor kinderen. PKU gel bevat een mengsel van essentiële en niet-essentiële aminozuren, vitamines, mineralen, spoorelementen en koolhydraten. PKU gel bestaat in 3 smaakvarianten : niet-gearomatiseerd, sinaasappelaroma en framboosaroma.
De gearomatiseerde varianten bevatten zoetstof.

Dosering
Dient te worden bepaald door de arts en/of diëtiste en is afhankelijk van de leeftijd, het lichaamsgewicht en de medische toestand van de patiënt.

Bereiding
Voor het beste resultaat is het aangeraden om PKU gel net voor gebruik te bereiden. Het is echter mogelijk om het bereide product 24 uur in de koelkast te bewaren. Wel opnieuw goed schudden voor gebruik.
BELANGRIJK Het is aangeraden om water te drinken na elke inname.

Variatietips
De smaak van PKU gel niet-gearomatiseerd kan gewijzigd worden door eenvoudigweg 1/2 FlavourPac zakje toe te voegen. Deze smaakzakjes bestaan in de smaken sinaasappel, cassis, citroen, framboos en tropical.

Belangrijk advies
Enkel te gebruiken onder medisch toezicht. PKU Gel niet-gearomatiseerd is geschikt voor kinderen vanaf 6 maand tot 10 jaar, PKU gel sinaasappel en framboos is geschikt voor kinderen vanaf 1 jaar tot 10 jaar.
Diëten op basis van PKU gel moeten voldoende natuurlijke eiwitten, water en andere essentiële voedingsstoffen aanbrengen om aan de voedingsbehoeften te voldoen.
Niet geschikt als enige voedingsbron.
Niet geschikt voor parenteraal gebruik.

Bewaring
Bewaren in een koele, droge omgeving. De zakjes bevatten een individuele dosis. Ongebruikt poeder in de koelkast en opgebruikt binnen de 24 uur.

Ingrediënten
PKU Gel niet-gearomatiseerd
Sucrose, zetmeel, L-lysine L-aspartaat, gemodificeerd zetmeel, L-leucine, L-tyrosine, glycine, L-arginine L-aspartaat, L-valine, L-glutamine, L-proline, L-threonine, L-isoleucine, tricalciumfosfaat, L-serine, calciumglycerofosfaat, L-alanine, L-histidine, trinatriumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, trikaliumcitraat, L-cystine, kaliumchloride, L-tryptofaan, L-methionine, choline bitartraat, L-arginine, maltodextrine, natriumchloride, L-ascorbinezuur, taurine, L-carnitine L-tartraat, nicotinamide, ijzersulfaat, zinkgluconaat, DL-α-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, mangaangluconaat, riboflavine, pyridoxine waterstofchloride, thiamine waterstofchloride, kopergluconaat, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, fyllochinon, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
PKU Gel framboos
Sucrose, zetmeel, L-lysine L-aspartaat, gemodificeerd zetmeel, L-leucine, L-tyrosine, glycine, L-arginine L-aspartaat, L-valine, L-glutamine, L-proline, L-threonine, L-isoleucine, tricalciumfosfaat, L-serine, calciumglycerofosfaat, L-alanine, L-histidine, trinatriumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, trikaliumcitraat, L-cystine, kaliumchloride, zuurteregelaar (appelzuur), L-tryptofaan, L-methionine, choline bitartraat, L-arginine, aroma, kleurstof (bietenrood), maltodextrine, natriumchloride, L-ascorbinezuur, taurine, zoetstof (acesulfaam K), L-carnitine L-tartraat, nicotinamide, ijzersulfaat, zinkgluconaat, DL-α-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, mangaangluconaat, riboflavine, pyridoxine waterstofchloride, thiamine waterstofchloride, kopergluconaat, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, fyllochinon, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
PKU Gel sinaasappel
Sucrose, zetmeel, L-lysine L-aspartaat, gemodificeerd zetmeel, L-leucine, L-tyrosine, glycine, L-arginine L-aspartaat, L-valine, L-glutamine, L-proline, L-threonine, L-isoleucine, zuurteregelaar (citroenzuur), tricalciumfosfaat, L-serine, calciumglycerofosfaat, L-alanine, L-histidine, trinatriumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, aroma, trikaliumcitraat, L-cystine, kaliumchloride, L-tryptofaan, L-methionine, choline bitartraat, L-arginine, maltodextrine, emulgator (**soja**lecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, zoetmiddel (acesulfaam K), taurine, L-carnitine L-tartraat, kleurstof (betacaroteen, bietenrood), nicotinamide, ijzersulfaat, zinkgluconaat, DL-α-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, mangaangluconaat, riboflavine, pyridoxine waterstofchloride, thiamine waterstofchloride, kopergluconaat, retinylacetaat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, fyllochinon, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.

Gebruiken voor eind: / Lotnr.: } **zie zijkant doos**

Page 9 - 145mm

NO

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

PKU Gel er et fenylalaninfritt proteinsubstitutt med smaksvariantene: nøytral, appelsin og bringebær. Det inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrater, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Til kostholdsbehandling av Fenylketonuri (PKU)
Smaksvariantene inneholder sukker og søtningsstoffer.

Dose og administrasjon
Dose skal bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog og er avhengig av pasientens alder, vekt, og medisinske tilstand.

Tilberedning
Ristes godt før bruk. Bør serveres kald.

Smaksvarianter
Produkt uten tilsatt smak kan smakssettes ved å bruke Vitaflo FlavourPac poser, som er tilgjengelig i smakene solbær, sitron, appelsin, bringebær og tropisk. Tilsett ½ til 1 pose FlavourPac til produktet uten smak, og tilbered som anvist.

Viktig
Må bare konsumeres av barn med etablert Fenylketonuri, under strengt medisinsk oppsyn.
De nøytrale produktene egner seg fra 6 måneder til 10 år. Smakssatte varianter egner seg fra 1 til 10 års alder. Dietten må suppleres med naturlig protein, vann og andre næringsstoffer i foreskrevne mengder for å tilfredsstille kravene til fenylalanin, væske og generelle næringsstoffer. Skal ikke brukes som eneste næringskilde. Ikke til intravenøs bruk.

Oppbevaring
Lagres på et kjølig, tørt sted.Posene er beregnet for engangs bruk. Hvis det er ubrukt pulver igjen i posen må det oppbevares i kjøleskap og brukes i løpet av 24 timer.

Ingredienser
GEL Nøytral
Sukker, Stivelse, L-Lysin L-Aspartat,Modifisert stivelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalsiumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenfosfat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Natriumklorid, L-Askorbinsyre, Taurin, L-Carnitin L-Tartrat, Nicotinamid, Jernsulfat, sinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kobberglukonat, retinylacetat, Folsyre (pteroylmonoglutaminsyre), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Bringebær
Sukker, Stivelse, L-Lysin L-Aspartat, Modifisert stivelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalciumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenfosfat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, surhetsregulerende medel (E296), L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Smaksstoff, Fargestoff (E162), Maltodextrin, Natriumklorid, L-Askorbinsyre, Taurin, kunstig søtningsmiddel (Acesulfam K), L-Carnitin L-Tartrat, Nicotinamid, Jernsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kobberglukonat, retinylacetat, Folsyre (pteroylmonoglutaminsyra), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Appelsin
Sukker, Stivelse, L-Lysin L-Aspartat, Modifisert Stivelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Surhetsregulerende medel (E330), Trikalciumfosfat, L-Serin, kalsiumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumhydrogenfosfat, smagstoff, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Emulgator (**Soya** Lecitin), Natriumklorid, L-Askorbinsyre, kunstig søtningsmiddel (Acesulfam K), Taurin, L-Carnitin L-Tartrat, Fargestoff (E160a, E162), Nicotinamid, Jernsulfat, sinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kobberglukonat, retinylacetat, Folsyre (pteroylmonoglutaminsyra), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Best før utgangen av / Batchnummer } **på siden av esken**

Page 10

Preparation Guidelines / Suggestions de préparation / Bereiding / Zubereitungshinweise / Brugsanvisning / Bruksanvisning / Instrucciones de preparación

FOR A DRINK / POUR OBTENIR UNE BOISSON / ALS GETRÄNK / TILBEREDNING TIL DRIK / BEREDNING AV DRYCK / PARA PREPARAR LA BEBIDA



		1	2	3
or	EN	Empty the contents of the sachet into the beaker.	Add approximately 80ml of cold water. Secure the lid and shake well for 10 seconds.	Drink immediately.
ou	FR	Verser le contenu d'un sachet dans un shaker.	Ajouter environ 80ml d'eau froide. Fermer le couvercle et bien agiter pendant 10 secondes.	Boire immédiatement.
of	NL	Giet de inhoud van 1 zakje in de shaker.	Voeg 80ml koud water toe. Sluit de shaker en schud krachtig gedurende 10 sec.	Onmiddellijk opdrinken.
oder	DE/AT	Inhalt des Portionsbeutels in einen Schüttelbecher geben.	Den Schüttelbecher mit 80 ml kaltem Wasser auffüllen, Deckel fest verschließen und 10 Sekunden lang kräftig schütteln.	Sofort trinken.
eller	DK/NO/SE	1 brev tømmes i et bæger. / Tøm innholdet i posen, pluss en pose FlavourPac hvis det er ønskelig, i en beholder med lokk. / Töm påsens innehåll i en bägare med lock.	Fyld bægeret 1/2 op med koldt vand (ca. 80 ml.) Sæt låget godt på og ryst i ca.10 sek. / Tilsett omtrent 80 ml kaldt vann. Sett på lokket og rist godt i 10 sekunder / Tillsätt ca 80ml kallt vatten. Se till att locket sitter fast, skaka sedan ordentligt i 10 sekunder.	Drik med det samme / Drikkes umiddelbart / Drick omedelbart.
o	ES	Vaciar el contenido del sobre en un vaso con tapa. Añadir agua fría hasta la mitad del vaso (100ml., aproximadamente).	Cerrar la tapa y agitar bien, durante 10 segundos.	Beber Inmediatamente.

Water or permitted drinks should be taken after PKU Gel / Boire impérativement de l'eau après la prise / Het is aangeraden om water te drinken na elke inname / Nach dem Verzehr sollten Wasser oder erlaubte Flüssigkeiten getrunken werden. / Vand eller anden tilladt væske skal indtages efter indtagelse af PKU Gel / Vann eller andre tillatte drikker bør tas etter PKU Gel/ Vatten eller annan tillåten vätska bör drickas efter PKU Gel / Debe tomarse agua u otras bebidas permitidas después del PKU Gel

Page 19

Height - 120mm

SE

LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL

PKU Gel är en fenylalaninfri proteinersättning som finns i tre smaker, neutral, hallon samt apelsin. Produkten innehåller essentiella- och icke-essentiella aminosyror, kolhydrater, vitaminer, mineraler samt spårämnen. För kostbehandling av Fenylketonuri (PKU).
Smaksatta alternativ innehåller socker och sötningsmedel.

Mängd och administrering
På beslut av läkare eller dietist beroende på ålder, kroppsvikt och medicinskt tillstånd.

Bruksanvisning
För bästa resultat så skall produkten användas direkt efter tillredning.
Viktigt - vatten eller annan tillåten vätska skall intas efteråt.

Smakvarianter
Det är möjligt att använda Vitaflos Flavourpac till den neutrala smaken. Flavourpac finns i smakerna: svarta vinbär, citron, apelsin, hallon och tropisk smak. Tillsätt ½-1 påse till en påse Gel.

Viktigt
Skall endast användas av barn med dokumenterad PKU.
Den neutrala smaken passar barn mellan 6 månader – 10 år. Smaksatta varianter lämpar sig till barn från 1 – 10 år. Kosten måste supplementeras med naturligt protein, vätska och andra näringsämnen för att täcka det dagliga behovet. Kan ej användas som enda näringskälla. Ej för parenteralt bruk.

Förvaring
Förvaras torrt och svalt, ej över normal rumstemperatur. Påsarna är tillverkade för att användas direkt. Vill man spara innehåll i påsen efter den öppnats, så skall den förvaras i kylskåp och användas inom 24 timmar.

Ingredienser
PKU Gel Neutral
Socker, Stärkelse, L-Lysin L-Aspartat, Modifierad stärkelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalciumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumvätefosfat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Natriumklorid, L-Askorbinsyra, Taurin , L-Carnitin L-Tartrat, Nicotinamid, Järnsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kopparglukonat, retinylacetat, Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Hallon
Socker, Stärkelse, L-Lysin L-Aspartat, Modifierad stärkelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Trikalciumfosfat, L-Serin, Kalciumglycerofosfat, L-Alanin, L-Histidin, Trinatriumcitrat, Magnesiumvätefosfat, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, Surhetsreglerande medel (E296), L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Smakämne, Färgämne (E162), Maltodextrin, Natriumklorid, L-Askorbinsyra, Taurin , Artificiellt Sötningsmedel (Acesulfam K), L-Carnitin L-Tartrat, Nicotinamid, Järnsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kopparglukonat, retinylacetat, Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
PKU Gel Apelsin
Socker, Stärkelse, L-Lysin L-Aspartat, Modifierad stärkelse, L-Leucin, L-Tyrosin, Glycin, L-Arginin L-Aspartat, L-Valin, L-Glutamin, L-Prolin, L-Treonin, L-Isoleucin, Surhetsreglerande medel (E330), trikalciumfosfat, L-Serine, kalciumglycerofosfat, L-Alanine, L-Histidine, Trinatriumcitrat, Magnesiumvätefosfat, Smakämnen, Trikaliumcitrat, L-Cystin, Kaliumklorid, L-Tryptofan, L-Metionin, Kolinbitartrat, L-Arginin, Maltodextrin, Emulgeringsmedel (**soja**lecitin), Natriumklorid, L-Askorbinsyra, Artificiellt Sötningsmedel (Acesulfam K), Taurin , L-Carnitin L-Tartrat, Färgämne (E160a, E162), Nicotinamid, Järnsulfat, Zinkglukonat, DL-alfa-tocopherylacetat, D-Calcium Pantotenat, Manganglukonat, Riboflavin, Pyridoxinhydroklorid, Thiaminhydroklorid, Kopparglukonat, retinylacetat, Folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), Kaliumjodid, Kromiumklorid, Natriummolybdat, Vitamin K (Fyllokinon), Natriumselenit, D-Biotin, Vitamin D3 (kolecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

Bäst före utgången av / Batchnummer } **Se på sidan av lådan**

Page 12 - 145mm

PL

ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO.

PKU Gel to niezawierający fenyloalaniny preparat w proszku, dostępny w różnych wariantach smakowych: pomarańczowym, malinowym oraz o smaku neutralnym. Zawierający zbilansowaną mieszaninę egzogennych i endogennych aminokwasów, węglowodany, cukry, witaminy, składniki mineralne, pierwiastki śladowe. Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii (PKU). Warianty smakowe zawierają cukier i substancję słodzącą.

Dawkowanie i sposób podawania
Zalecana dawka produktu zależy od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta i powinna być określona przez lekarza lub dietetyka.

Sposób przygotowania:
Preparat powinien być przygotowany świeżo przed spożyciem i jeśli to możliwe natychmiast użyty.

Ważne: Wskazane jest spożycie wody lub innych dozwolonych napojów po przyjęciu PKU Gel w postaci żelu lub napoju.

Dodatki smakowe FlavourPac
PKU Gel o smaku neutralnym można stosować również z dodatkami smakowymi FlavourPac. Saszetki FlavourPac dostępne są o smaku: czarnej porzeczki, cytrynowym, pomarańczowym, malinowym i owoców tropikalnych. Należy dodać 1/2 saszetki FlavourPac do produktu o smaku neutralnym i przygotować zgodnie z zaleceniami.

Ważna informacja
Do postępowania dietetycznego wyłącznie u dzieci z potwierdzoną fenyloketonurią (PKU). Stosować pod ścisłą kontrolą lekarza.
Preparat o smaku neutralnym odpowiedni do stosowania od 6 miesiąca życia do 10. roku życia.
Preparaty smakowe odpowiednie do stosowania od 1. do 10. roku życia. Codzienna dieta powinna być uzupełniona o naturalne białka, wodę i inne składniki odżywcze w zalecanych ilościach, aby dostarczyć fenyloalaninę, płyny i spełnić ogólne wymagania żywieniowe.
Nie stosować jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować pozajelitowo.

Warunki przechowywania
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Saszetka to porcja preparatu w proszku przeznaczona do pojedynczego użycia. Po otwarciu nieużyty preparat przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.

Składniki
PKU Gel o smaku neutralnym
sacharoza, skrobia, L-asparaginian L-lizyny, skrobia modyfikowana, L-leucyna, L-tyrozyna, glicyna, L-asparaginian L-argininy, L-walina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-izoleucyna, fosforan trójwapniowy, L-seryna, glicerofosforan wapnia, L-alanina, L-histydyna, cytrynian sodu, wodorofosforan magnezu, cytrynian potasu, L-cystyna, chlorek potasu, L-tryptofan, L-metionina, dwuwinian choliny, L-arginina, maltodekstryna, chlorek sodu, kwas L-askorbinowy, tauryna, L-winian-L-karnityny, nikotynamid, siarczan żelaza (II), glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, glukonian manganu, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, glukonian miedzi (II), octan retinylu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodek potasu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, witamina K (filochinon), selenian sodu (IV), D-biotyna, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).
PKU Gel o smaku malinowym
sacharoza, skrobia, L-asparaginian L-lizyny, skrobia modyfikowana, L-leucyna, L-tyrozyna, glicyna, L-asparaginian L-argininy, L-walina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-izoleucyna, fosforan trójwapniowy, L-seryna, glicerofosforan wapnia, L-alanina, L-histydyna, cytrynian sodu, wodorofosforan magnezu, cytrynian potasu, L-cystyna, chlorek potasu, regulator kwasowości (E296), L-tryptofan, L-metionina, dwuwinian choliny, L-arginina, aromat, barwnik (E162), maltodekstryna, chlorek sodu, kwas L-askorbinowy, tauryna, substancja słodząca (acesulfam K), L-winian-L-karnityny, nikotynamid, siarczan żelaza (II), glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, glukonian manganu, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, glukonian miedzi (II), octan retinylu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodek potasu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, witamina K (filochinon), selenian sodu (IV), D-biotyna, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).
PKU Gel o smaku pomarańczowym
sacharoza, skrobia, L-asparaginian L-lizyny, skrobia modyfikowana, L-leucyna, L-tyrozyna, glicyna, L-asparaginian L-argininy, L-walina, L-glutamina, L-prolina, L-treonina, L-izoleucyna, regulator kwasowości (E330), fosforan trójwapniowy, L-seryna, glicerofosforan wapnia, L-alanina, L-histydyna, cytrynian sodu, wodorofosforan magnezu, aromat, cytrynian potasu, L-cystyna, chlorek potasu, L-tryptofan, L-metionina, dwuwinian choliny, L-arginina, maltodekstryna, emulgator (lecytyna **sojowa**), chlorek sodu, kwas L-askorbinowy, substancja słodząca (acesulfam K), tauryna, L-winian-L-karnityny, barwniki (E160a, E162), nikotynamid, siarczan żelaza (II), glukonian cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotenian wapnia, glukonian manganu, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, glukonian miedzi (II), octan retinylu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), jodek potasu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, witamina K (filochinon), selenian sodu (IV), D-biotyna, witamina D3 (cholekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

Najlepiej spożyć przed końcem: / Numer partii: } **Patrz na opakowaniu**

Page 17 - 145mm

Preparation Guidelines / Suggestions de préparation / Bereiding / Zubereitungshinweise / Brugsanvisning / Bruksanvisning / Instrucciones de preparación

FOR A GEL / POUR OBTENIR UN ENTREMET / ALS GEL / TILBEREDNING TIL GEL / BEREDNING TILL GEL / PARA PREPARAR EL GEL



	1	2	3
EN	Empty the contents of the sachet into the beaker.	Add 30ml of cold water. Secure the lid and shake well for 10 seconds.	Leave to stand for 2 minutes allowing a smooth gel to form. Consume from spoon.
FR	Verser le contenu d'un sachet dans un shaker.	Ajouter environ 30ml d'eau froide. Fermer le couvercle et bien secouer pendant 10 secondes.	Laisser reposer 2 minutes le temps que la préparation épaississe et consommer à la cuillère.
NL	Giet de inhoud van 1 zakje in de shaker.	Voeg 30ml koud water toe. Sluit de shaker en schud krachtig gedurende 10 sec.	Laat 2 minuten rusten. Er vormt zich een zacht papje. Bied onmiddellijk aan met een lepeltje.
DE/AT	Inhalt des Portionsbeutels (und gegebenenfalls 1/2 - 1 Beutel FlavourPac) in einen Schüttelbecher geben.	Den Schüttelbecher mit 30 ml kaltem Wasser auffüllen, Deckel fest verschließen und 10 Sekunden lang kräftig schütteln.	Zur Gelbildung 2 Minuten lang stehen lassen. Das Gel wird vom Löffel gereicht und sofort vollständig verzehrt.
DK/NO/SE	1 brev tømmes i et bæger. /Tøm innholdet i posen i en beholder med lokk / Töm påsens innehåll i en bägare med lock.	Tilsæt 30ml. koldt vand. Sæt låget godt på og ryst godt i ca. 10 sek. / Tilsett omtrent 30ml kaldt vann. Sett på lokket og rist godt i 10 sekunder. / Tillsätt 30ml vatten. Se till att locket sitter fast, skaka sedan ordentligt i 10 sekunder.	Lad hvile i 2 min. for at danne en blød gele./La den stå i 2 minutter slik at det danner seg en jevn gel/ Låt stå i 2 min. för att bilda en mjuk puré. Indtag med ske / Innta fra skje / Inta från sked.
ES	Vaciar el contenido del sobre en un vaso con tapa. Verter 30 ml de agua fría dentro del vaso Añadir un sobre de azúcar si es nexesario.	Cerrar la tapa y agitar bien, durante 10 segundos	Dejar reposar durante 2 minutos hasta que se forme un gel fino. Consumir de la cuchara.

Water or permitted drinks should be taken after PKU Gel / Boire impérativement de l'eau après la prise / Het is aangeraden om water te drinken na elke inname / Nach dem Verzehr sollten Wasser oder erlaubte Flüssigkeiten getrunken werden. / Vand eller anden tilladt væske skal indtages efter indtagelse af PKU Gel / Vann eller andre tillatte drikker bør tas etter PKU Gel/ Vatten eller annan tillåten vätska bör drickas efter PKU Gel / Debe tomarse agua u otras bebidas permitidas después del PKU Gel

Page 18

PT

ALIMENTO PARA FINS MEDICINAIS ESPECÍFICOS

PKU Gel é um substituto proteico em pó isento de fenilalanina, disponível com sabores neutro, laranja e framboesa, contendo aminoácidos essenciais e não-essenciais, hidratos de carbono, vitaminas, minerais e oligo-elementos. Destinado à satisfação das necessidades nutricionais de doentes com fenilcetonúria (PKU).
As variedades com sabor contêm adoçantes.

Dosagem e Administração
Dependente da idade, peso e das necessidades individuais a determinar pelo médico ou nutricionista.

Preparação
Para obter os melhores resultados o produto deve ser preparado e usado logo de seguida. Contudo, se necessário, poderá guardar no frigorífico durante 24 horas. Agitar de novo antes de usar. IMPORTANTE: Depois de ingerir PKU Gel pó deverá beber-se um pouco de água ou outra bebida permitida.

Ideias para aromatizar
Para introduzir maior variedade aqui temos algumas sugestões. O produto neutro pode ser aromatizado usando saquetas Vitaflo FlavourPac. Disponíveis em amora, laranja, limão, framboesa e tropical. Basta adicionar ½ ou 1 saqueta de FlavourPac ao produto Neutro tal como indicado. Para obter um sabor mais forte e frutado, poderá também adicionar sumos de frutos permitidos.

Nota Importante:
• Este produto só deve ser consumido por pessoas com diagnóstico de Fenilcetonúria (PKU), e sob supervisão médica.
• A variedade com sabor neutro é adequada partir dos 6 meses até aos 10 anos de idade.
• As variedades com sabores são adequadas a partir dos 12 meses até aos 10 anos de idade
• A dieta deve ser suplementada com proteína natural, água e outros nutrientes, para fornecer as quantidades de fenilalanina requeridas.
• Não utilizar como fonte alimentar única.
• Não adequado para uso intravenoso.

Armazenagem
Conservar em local seco e fresco. As saquetas foram pensadas para uso imediato. Eventual quantidade de pó não utilizado deve ser conservada no frigorífico e consumida dentro de 24 horas.

Ingredientes
PKU Gel Neutro:
Sacarose, Amido, L-Lisina-L-Aspartato, Amido modificado, L-Leucina, L-Tirosina, L-Glicina, L-Arginina-L-Aspartato, L-Valina, L-Glutamina, L-Prolina, L-Treonina, L-Isoleucina, Fosfato tricálcico, L-Serina, Glicerofosfato de cálcio, L-Alanina, L-Histidina, Citrato trissódico, Hidrogenofosfato de magnésio, Citrato tripotássico, L-Cistina, Cloreto de potássio, L-Triptofano, L-Metionina, Bitartarato de Colina, L-Arginina, Maltodextrina, Cloreto de sódio, L-Ácido ascórbico Taurina, L-Carnitina-L-Tartarato, Nicotinamida, Sulfato Ferroso, Gluconato de zinco, Acetato de DL-α-tocoferilo, D-pantotenato de cálcio, Gluconato de manganês, Riboflavina, Cloridrato de piridoxina, Cloridrato de tiamina, Gluconato cúprico, Acetato de retinilo, Ácido fólico, Iodeto de potássio, Cloreto de crómio, Molibdato de amónio, Vitamina k1 (filoquinona), Selenito de sódio, D-Biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamnina B12 (Cianocobalamina).
PKU Gel Framboesa:
Sacarose, Amido, L-Lisina-L-Aspartato, Amido modificado, L-Leucina, L-Tirosina, L-Glicina, L-Arginina-L-Aspartato, L-Valina, L-Glutamina, L-Prolina, L-Treonina, L-Isoleucina, Fosfato tricálcico, L-Serina, Glicerofosfato de cálcio, L-Alanina, L-Histidina, Citrato trissódico, Hidrogenofosfato de magnésio, Citrato tripotássico, L-Cistina, Cloreto de potássio, regulador de la acidez (E296), L-Triptofano, L-Metionina, Bitartarato de Colina, L-Arginina, Aromatizante, Corante (E162), Maltodextrina, Cloreto de sódio, L-Ácido ascórbico, Taurina, Edulcorante artificial (Acesulfame K), L-Carnitina-L-Tartarato, Nicotinamida, Sulfato Ferroso, Gluconato de zinco, Acetato de DL-α-tocoferilo, D-pantotenato de cálcio, Gluconato de manganês, Riboflavina, Cloridrato de piridoxina, Cloridrato de tiamina, Gluconato cúprico, Acetato de retinilo, Ácido fólico, Iodeto de potássio, Cloreto de crómio, Molibdato de amónio, Vitamina k1 (filoquinona), Selenito de sódio, D-Biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamnina B12 (Cianocobalamina).
PKU Gel Laranja:
Sacarose, Amido, L-Lisina-L-Aspartato, Amido modificado, L-Leucina, L-Tirosina, L-Glicina, L-Arginina-L-Aspartato, L-Valina, L-Glutamina, L-Prolina, L-Treonina, L-Isoleucina, Fosfato tricálcico, L-Serina, Glicerofosfato de cálcio, L-Alanina, L-Histidina, Citrato trissódico, Hidrogenofosfato de magnésio, Aromatizante, Citrato tripotássico, L-Cistina, Cloreto de potássio, L-Triptofano, L-Metionina, Bitartarato de Colina, L-Arginina, Maltodextrina, Emulsionanate (**lecitina de soja**), Cloreto de sódio, L-Ácido ascórbico, Edulcorante artificial (Acesulfame K), Taurina, L-Carnitina-L-Tartarato, Nicotinamida, Sulfato Ferroso, Gluconato de zinco, Acetato de DL-α-tocoferilo, D-pantotenato de cálcio, Gluconato de manganês, Riboflavina, Cloridrato de piridoxina, Cloridrato de tiamina, Gluconato cúprico, Acetato de retinilo, Ácido fólico, Iodeto de potássio, Cloreto de crómio, Molibdato de amónio, Vitamina k1 (filoquinona), Selenito de sódio, D-Biotina, Vitamina D3 (colecalciferol), Vitamnina B12 (Cianocobalamina).

Consumir de preferência antes de: / Número de Lote: } **Ver Lado da caixa**

Page 11

Height - 120mm

HU

SPECIÁLIS - GYÓGYÁSZATI CÉLRA SZÁNT - ÉLELMISZER

Fenilalanin-mentes, fehérjét helyettesítő, esszenciális és nem esszenciális aminosavakat, szénhidrátot, cukrot, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazó natúr, málna és narancs ízű tápszer fenilketonúria (PKU) diétás ellátására.
Málna és narancs ízű: Cukorral és édesítőszerrel.

Adagolás:
A PKU Gel adagolását klinikai orvos vagy dietetikus határozza meg a következő tényezőket figyelembe véve: kor, testtömeg és a beteg egészségi állapota.

Felhasználási útmutató:
A terméket javasolt frissen elkészíteni és az elkészítés után azonnal elfogyasztani. A PKU Gel elfogyasztása után igyon vizet vagy egyéb megengedett italt.

Fontos figyelmeztetés:
Kizárólag bizonyított fenilketonúria esetén adható. Csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.
A natúr ízű termékek 6 hónapos kortól 10 éves korig fogyaszthatók.
Az ízesített termékek 1-10 éves kor között fogyaszthatók.
Az elégséges fenilalanin-, folyadék- és tápanyagbevitel érdekében a diétát megfelelő mennyiségű természetes fehérjeforrással, vízzel és egyéb tápanyagokkal kell kiegészíteni. Kizárólagos tápanyagforrásként nem használható. Parenterálisan nem alkalmazható.

Tárolási körülmények:
Tárolja száraz, hűvös helyen. A tasak tartalma egy adagnak felel meg. A fel nem használt adagot a felnyitást követően tartsa hűtőben és 24 órán belül fogyassza el.

Összetevők
NATÚR ízű
szacharóz, keményítő, L-lizin-L-aszpartát, módosított keményítő, L-leucin, L-tirozin, glicin, L-arginin-L-aszpartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-treonin, L-izoleucin, trikalcium-foszfát, L-szerin, kalcium-glicerofoszfát, L-alanin, L-hisztidin, nátrium-citrát, magnézium-hidrogén-foszfát, kálium-citrát, L-cisztein, kálium-klorid, L-triptofán, L-metionin, kolin-bitartarát, L-arginin, maltodextrin, nátrium-klorid, L-aszkorbinsav, taurin, L-karnitin-L-tartarát, nikotinamid, vas-szulfát, cink-glükonát, DL-alfa-tokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, mangán-glükonát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, réz-glükonát, retinil-acetát, pteroil-monoglutaminsav (folsav), kálium-jodid, króm-klorid, nátrium-molibdát, fillokinon (K-vitamin), nátrium-szelenit, D-biotin, kolekalciferol (D3-vitamin), ciano-kobalamin (B12-vitamin).
MÁLNA ízű
szacharóz, keményítő, L-lizin-L-aszpartát, módosított keményítő, L-leucin, L-tirozin, glicin, L-arginin-L-aszpartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-treonin, L-izoleucin, trikalcium-foszfát, L-szerin, kalcium-glicerofoszfát, L-alanin, L-hisztidin, nátrium-citrát, magnézium-hidrogén-foszfát, kálium-citrát, L-cisztein, kálium-klorid, savanyúságot szabályozó anyag (E296), L-triptofán, L-metionin, kolin-bitartarát, L-arginin, aroma, színezék (E162), maltodextrin, nátrium-klorid, L-aszkorbinsav, taurin, édesítőszer (aceszulfám K), L-karnitin-L-tartarát, nikotinamid, vas-szulfát, cink-glükonát, DL-alfa-tokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, mangán-glükonát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, réz-glükonát, retinil-acetát, pteroil-monoglutaminsav (folsav), kálium-jodid, króm-klorid, nátrium-molibdát, fillokinon (K-vitamin), nátrium-szelenit, D-biotin, kolekalciferol (D3-vitamin), ciano-kobalamin (B12-vitamin).
NARANCS ízű
szacharóz, keményítő, L-lizin-L-aszpartát, módosított keményítő, L-leucin, L-tirozin, glicin, L-arginin-L-aszpartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-treonin, L-izoleucin, savanyúságot szabályozó anyag (E330), trikalcium-foszfát, L-szerin, kalcium-glicerofoszfát, L-alanin, L-hisztidin, nátrium-citrát, magnézium-hidrogén-foszfát, aroma, kálium-citrát, L-cisztein, kálium-klorid, L-triptofán, L-metionin, kolin-bitartarát, L-arginin, maltodextrin, emulgeálószer (**szójalecitin**), nátrium-klorid, L-aszkorbinsav, édesítőszer (aceszulfám K), taurin, L-karnitin-L-tartarát, színezék (E160a, E162), nikotinamid, vas-szulfát, cink-glükonát, DL-alfa-tokoferil-acetát, kalcium-D-pantotenát, mangán-glükonát, riboflavin, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, réz-glükonát, retinil-acetát, pteroil-monoglutaminsav (folsav), kálium-jodid, króm-klorid, nátrium-molibdát, fillokinon (K-vitamin), nátrium-szelenit, D-biotin, kolekalciferol (D3-vitamin), ciano-kobalamin (B12-vitamin).

Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig / Batch kód: lásd a doboz oldalán.

Page 16 - 145mm

TR

ÖZEL TIBBİ AMAÇLI GIDA

PKU Gel, fenilalanin dışındaki tüm esansiyel ve esansiyel olmayan aminoasitler, karbonhidrat, vitamin, mineral ve eser elementler içeren toz formda bir protein desteğidir. Aromasız, portakal aromalı ve ahududu aromalı seçenekleri mevcuttur. Fenilketonüri'nin (PKU) diyet yönetiminde kullanılır. Aromalı seçenekler şeker ve tatlandırıcı içermektedir.

Dozaj ve Kullanım
Hastanın yaşına , vücut ağırlığına ve tıbbi durumuna göre doktor ve/veya diyetisyen tarafından belirlenmelidir.

Hazırlama Talimatları
En iyi sonuçlar için ürün taze olarak hazırlanmalı ve mümkün olduğunca hemen tüketilmelidir. Bununla birlikte eğer gerek duyuluyorsa buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir-Kullanımdan önce tekrar çalkalayın.

ÖNEMLİ
Su veya izin verilen diğer içecekler PKU jelden veya PKU içecekten sonra alınmalıdır.
Daha detaylı bilgi için kutu üzerine bakınız.

Önemli Uyarı
Sıkı tıbbi gözetim altında, yalnızca teşhis edilmiş Fenilketonürili hastalar tarafından kullanılmalıdır.
Aromasız seçenek 6 aydan 10 yaşına kadarki Fenilketonürili hastalar için uygundur.
Aromalı seçenekler ise 1 yaşından 10 yaşına kadarki Fenilketonüri hastaları için uygundur.
Diyet mutlaka önerilen miktarlarda fenilalanin gereksinimlerinin karşılanabilmesi için doğal protein, su ve diğer besinlerle desteklenmelidir.
Tek başına bir beslenme kaynağı olarak kullanıma uygun değildir.
Parenteral kullanıma uygun değildir.

Saklama
Kuru ve serin bir yerde saklayınız. Saşeler tek kullanım için hazırlanmıştır, saşede kullanılmayan miktar buzdolabında saklanmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.

İçerik Bilgisi
PKU GEL Aromasız
Sukroz, nişasta, L-lizin L-aspartat, modifiye nişasta, L-lösin, L-tirozin, glisin, L-arjinin L-aspartat, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-treonin, L-izolösin, trikalsiyum fosfat, L-serin, kalsiyum gliserofosfat, L-alanin, L-histidin, trisodyum sitrat, magnezyum hidrojen fosfat, tripotasyum sitrat, L-sistin, potasyum klorür, L-triptofan, L-metiyonin, kolin bitartarat, L-arjinin, maltodekstrin, sodyum klorür, L-askorbik asit, taurin, L-karnitin L-tartarat, nikotinamid, demir sülfat, çinko glukonat, DL-Alfa-Tokoferil asetat, D-kalsiyum pantotenat, manganez glukonat, riboflavin, pridoksin hidroklorür, tiyamin hidroklorür, bakır glukonat, Retinil Asetat, folik asit (pteroilmonoglutamik asit), potasyum iyodür, krom klorür, sodyum molibdat, vitamin K(filokinon), sodyum selenit, D-biyotin, vitamin D3 (kolekalsiferol), vitamin B12(siyanokobalamin).
PKU Gel Ahududu
Sukroz, nişasta, L-lizin L-aspartat, modifiye nişasta, L-lösin, L-tirozin, glisin, L-arjinin L-aspartat, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-treonin, L-izolösin, trikalsiyum fosfat, L-serin, kalsiyum gliserofosfat, L-alanin, L-histidin, trisodyum sitrat, magnezyum hidrojen fosfat, tripotasyum sitrat, L-sistin, potasyum klorür, malik asit (asit düzenleyici E296), L-triptofan, L-metiyonin, kolin bitartarat, L-arjinin, aroma, renklendirici(E162), maltodekstrin, sodyum klorür, L-askorbik asit, taurin, yapay tatlandırıcı (asesülfam K), L-karnitin L-tartarat, nikotinamid, demir sülfat, çinko glukonat, DL-Alfa-Tokoferil asetat, D-kalsiyum pantotenat, manganez glukonat, riboflavin, pridoksin hidroklorür, tiyamin hidroklorür, bakır glukonat, Retinil Asetat, folik asit (pteroilmonoglutamik asit), potasyum iyodür, krom klorür, sodyum molibdat, vitamin K(filokinon), sodyum selenit, D-biyotin, vitamin D3(Kolekalsiferol), vitamin B12(siyanokobalamin).
PKU Gel Portakal
Sukroz, nişasta, L-lizin L-aspartat, modifiye nişasta, L-lösin, L-tirozin, glisin, L-arjinin L-aspartat, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-treonin, L-izolösin, sitrik asit (asit düzenleyici E330), trikalsiyum fosfat, L-serin, kalsiyum gliserofosfat, L-alanin, L-histidin, trisodyum sitrat, magnezyum hidrojen fosfat, aroma, tripotasyum sitrat, L-sistin, potasyum klorür, L-triptofan, L-metiyonin, kolin bitartarat, L-arjinin, maltodekstrin, emülgatör (**soya lesitin**), sodyum klorür, L-askorbik asit, yapay tatlandırıcı (asesülfam K), taurin, L-karnitin L-tartarat, renklendirici (E160a, E162), nikotinamid, demir sülfat, çinko glukonat, DL-Alfa-Tokoferil asetat, D-kalsiyum pantotenat, manganez glukonat, riboflavin, pridoksin hidroklorür, tiyamin hidroklorür, bakır glukonat, Retinil Asetat, folik asit (pteroilmonoglutamik asit), potasyum iyodür, krom klorür, sodyum molibdat, vitamin K(filokinon), sodyum selenit, D-biyotin, vitamin D3(kolakalsiferol), vitamin B12 (siyanokobalamin).

Son Kullanma Tarihi / Seri Numarası } **Kutu yanına bakınız**

Page 13 - 145mm

CZ

POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY.

PKU Gel je sypký výrobek bez fenylalaninu, obsahuje esenciální a neesenciální aminokyseliny, sacharidy, vitamíny, minerální látky a stopové prvky. Určeno pro řízenou dietní výživu při prokázané fenylketonurii (PKU). Výrobek je k dispozici neochucený, s příchutí pomeranče a malin. Ochucené výrobky obsahují cukr a sladidlo.

Dávkování:
Dávkování určí lékař či dietolog po příslušném klinickém stanovení. Dávkování se mění v závislosti na věku, tělesné hmotnosti a klinickém stavu pacienta.

Tipy na ochucení:
Neochucený výrobek lze ochutit Vitaflo FlavourPack sáčky, které jsou k dispozici v příchutích černého rybízu, citrónu, pomeranče, malin a tropické ovoce. Jednoduše přidejte 1/2 - 1 sáček s příchutí výrobku a dále připravte podle návodu.

Návod na přípravu:
Pro dosažení lepších výsledků připravujte nápoj vždy čerstvý a po přípravě ho ihned zkonzumujte. Před použitím dobře protřepejte. V případě potřeby uchovejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin - před použitím protřepte.
DŮLEŽITÉ - Vodu či jiné povolené nápoje můžete pít po konzumaci PKU Gel.

Důležité upozornění:
Určeno pouze pro děti s prokázanou fenylketonurií (PKU). Potravina může být používána pouze pod dohledem lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinické výživy.
Neochucený výrobek je vhodný od 6 měsíců do 10 let věku.
Ochucené výrobky přípravku jsou vhodné od 1 do 10 let věku.
Dieta musí být doplněna přirozenou bílkovinou, vodou a dalšími nutrienty ve stanoveném množství tak, aby byl zabezpečen přísun fenylalaninu, tekutin a všeobecných požadavků na výživu.
Potravina není vhodná jako jediný zdroj výživy.
Není určeno k parenterálnímu použití!

Skladovací podmínky:
Uchovejte v suchu při pokojové teplotě. Sáček je na jedno použití. Neotevřené skladujte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin.

Příchutě:
PKU Gel bez příchutě
Složení: cukr, škrob, L-lysin-L-aspartát, modifikovaný škrob, L-leucin, L-thyrosin, glycin, L-arginin-L-aspartát , L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-threonin, L-isoleucin, fosforečnan vápenatý, L-serin, glycerofosforečnan vápenatý, L-alanin, L-histidin, citronan sodný, hydrogenfosforečnan hořečnatý, citronan draselný, L-cystin, cholin bitartát, L-tryptofan, L-methionin, cholin bitartát, L-arginin, maltodextrin, chlorid sodný, L-askorbová kyselina, taurin, L-karnitin-L-vinan, nikotinamid, síran železnatý, glukonan zinečnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, glukonan manganatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, glukonan měďnatý, retinyl-acetát, kyselina listová, jodid draselný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát, molybdenan sodný, vitamín K (fyllochinon), seleničitan sodný, D-biotin, vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamin).
PKU Gel s příchutí Malina
Složení: cukr, škrob, L-lysin-L-aspartát, modifikovaný škrob, L-leucin, L-thyrosin, glycin, L-arginin-L-aspartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-threonin, L-isoleucin, fosforečnan vápenatý, L-serin, glycerofosforečnan vápenatý, L-alanin, L-histidin, citronan sodný, hydrogenfosforečnan hořečnatý, citronan draselný, L-cystin, chlorid draselný, regulátor kyselosti (kyselina jablečná), L-tryptofan, L-methionin, cholin bitartát, L-arginin, aroma, barvivo (betanin), maltodextrin, chlorid sodný, L-askorbová kyselina, taurin, sladidlo (Acesulfam K), L-karnitin-L-vinan, nikotinamid, síran železnatý, glukonan zinečnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, glukonan manganatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, glukonan měďnatý, retinyl-acetát, kyselina listová, jodid draselný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát, molybdenan sodný, vitamín K (fyllochinon), seleničitan sodný, D-biotin, vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamin).
PKU Gel s příchutí Pomeranč
Složení: cukr, škrob, L-lysin-L-aspartát, modifikovaný škrob, L-leucin, L-thyrosin, glycin, L-arginin-L-aspartát, L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-threonin, L-isoleucin, regulátor kyselosti (kyselina citronová), fosforečnan vápenatý, L-serin, glycerofosforečnan vápenatý, L-alanin, L-histidin, citronan sodný, hydrogenfosforečnan hořečnatý, aroma, citronan draselný, L-cystin, chlorid draselný, L-tryptofan, L-methionin, cholin bitartát, L-arginin, maltodextrin, emulgátor (**sójový** lecitin), chlorid sodný, L-askorbová kyselina, sladidlo (Acesulfam K), taurin, L-karnitin-L-vinan, barviva (karoteny, betanin), nikotinamid, síran železnatý, glukonan zinečnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, glukonan manganatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid, glukonan měďnatý, retinyl-acetát, kyselina listová, jodid draselný, chlorid chromitý a jeho hexahydrát , molybdenan sodný, vitamín K (fyllochinon), seleničitan sodný, D-biotin, vitamín D3 (cholekalciferol), vitamín B12 (kyanokobalamin).

Minimální trvanlivost do konce / Číslo šarže: viz obal.

Page 14

SK

POTRAVINY NA OSOBITNÉ LEKÁRSKE ÚČELY.

PKU Gel je sypký výrobok bez fenylalanínu, obsahuje esenciálne a neesenciálne aminokyseliny, sacharidy, vitamíny, minerálne látky a stopové prvky. Určené na diétny režim pri fenylketonúrii (PKU). Výrobok je k dispozícii neochutený, s príchuťou pomaranča a malín. Ochutené výrobky obsahujú cukor a sladidlo.

Dávkovanie
Dávkovanie určí lekár alebo dietológ po príslušnom klinickom stanovení. Dávkovanie sa mení v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a klinického stavu pacienta.

Návod na prípravu
Na dosiahnutie lepších výsledkov pripravujte nápoj vždy čerstvý a ihneď skonzumujte. Pred použitím dobre potrepte. V prípade potreby skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín – pred použitím potrepte.
DÔLEŽITÉ - PKU Gel je po požití vhodné zapiť vodou alebo inými povolenými nápojmi.

Tipy na ochutenie
Neochutený výrobok môže byť ochutený Vitaflo FlavourPac vrecúškami, ktoré sú k dispozícii v príchutiach čierne ríbezle, citrón, pomaranč, malina a tropické ovocie. Jednoducho pridajte 1/2 - 1 vrecúško s príchuťou k výrobku a ďalej pripravte podľa návodu.

Dôležité upozornenie:
Určené iba pre deti s dokázanou fenylketonúriou (PKU).
Potravinu možno používať len pod lekárskym dohľadom alebo kvalifikovaného odborníka v oblasti klinickej výživy.
Neochutený výrobok je vhodný od 6 mesiacov do 10 rokov veku.
Ochutené výrobky sú vhodné od 1 do 10 rokov veku.
Diéta musí byť doplnená o prirodzené zdroje bielkovín, vodu a ďalšie živiny v predpísanom množstve na udržanie nevyhnutného príjmu fenylalanínu, tekutín a na pokrytie všeobecných výživových požiadaviek.
Potravina nie je vhodná ako jediný zdroj výživy.
Neslúži na parenterálne použitie!

Skladovanie
Skladujte v suchu pri izbovej teplote. Vrecká sú určené na jedno použitie. Nespotrebované vrecko skladujte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.

Príchute:
PKU Gel Neochutený
Zloženie: cukor, škrob, L-lyzín-L-aspartát, modifikovaný škrob, L-leucín, L-tyrozín, glycín, L-arginín-L-aspartát, L-valín, L-glutamín, L-prolín, L-treonín, L-izoleucín, fosforečnan vápenatý, L-serín, glycerofosforečnan vápenatý, L-alanín, L-histidín, citran sodný, hydrogénfosforečnan horečnatý, citran draselný, cystín, chlorid draselný, L-tryptofán, L-metionín, cholín dvojvínan, L-arginín, maltodextrín, chlorid sodný, kyselina L-askorbová, taurín, L-karnitín-L-vínan, nikotínamid, síran železnatý, glukónan zinočnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, glukónan mangánatý, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, tiamínhydrochlorid, glukónan meďnatý, retinylacetát, kyselina listová, jodid draselný, chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, molybdénan sodný, fylochinón, seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.
PKU Gel Príchuť maliny
Zloženie: cukr, škrob, L-lyzín-L-aspartát, modifikovaný škrob, L-leucín, L-tyrozín, glycín, L-arginín-L-aspartát, L-valín, L-glutamín, L-prolín, L-treonín, L-izoleucín, fosforečnan vápenatý, L-serín, glycerofosforečnan vápenatý, L-alanín, L-histidín, citran sodný, hydrogénfosforečnan horečnatý, citran draselný, cystín, chlorid draselný, regulátor kyslosti (kyselina jablčná), L-tryptofán, L-metionín, cholín dvojvínan, L-arginín, aróma, farbivo (betanín), maltodextrín, chlorid sodný, kyselina L-askorbová, taurín, sladidlo (Acesulfám K), L-karnitín-L-vínan, nikotínamid, síran železnatý, glukónan zinočnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, glukónan mangánatý, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, tiamínhydrochlorid, glukónan meďnatý, retinylacetát, kyselina listová, jodid draselný, chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, molybdénan sodný, fylochinón, seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.
PKU Gel Príchuť pomaranč
Zloženie: cukor, škrob, L-lyzín-L-aspartát, modifikovaný škrob, L-leucín, L-tyrozín, glycín, L-arginín-L-aspartát, L-valín, L-glutamín, L-prolín, L-treonín, L-izoleucín, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), fosforečnan vápenatý, L-serín, glycerofosforečnan vápenatý, L-alanín, L-histidín, citran sodný, hydrogénfosforečnan horečnatý, aróma, citran draselný, cystín, chlorid draselný, L-tryptofán, L-metionín, cholín dvojvínan, L-arginín, maltodextrín, emulgátor (**sójový** lecitín), chlorid sodný, kyselina L-askorbová, sladidlo (Acesulfám K), taurín, L-karnitín-L-vínan, farbivá (karotény, betanín), nikotínamid, síran železnatý, glukónan zinočnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, glukónan mangánatý, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, tiamínhydrochlorid, glukónan meďnatý, retinylacetát, kyselina listová, jodid draselný, chlorid chromitý (III) a jeho hexahydrát, molybdénan sodný, fylochinón, seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín.

Minimálna trvanlivosť do konca: / Číslo šarže: pozri obal.

Page 15