NUTRICIA

Infatrini

Für Säuglinge/Adequado para lactentes/Dla niemowląt i dzieci/ Για βρέφη/Pro kojence/Pre dojčatá

24 x 125 ml = 3000 ml

Nährwertdeklaration pro 100 ml/Composição nutricional por 100 ml/Wartość odżywcza 100 ml/ Θρεπτικές συστάσεις ανά 100 ml/Priemerný obsah vo 100 ml/Výživná složka na 100 ml:	
Energie/Energia/ Wartość energetyczna/Ενέργεια/ 418 kJ/ **Energetická hodnota/Energia** 100 kcal	
Fett/Lipidos/Tłuszcz/Λιπαρά/ Tuky 5,4 g	
davon/dos quais/w tym/z nich/z toho	
- Gesättigte Fettsäuren/Saturados/ Kwasy nasycone/Κορεσμένα/ Nasýtené mastné kyseliny	2,6 g
- Einfach ungesättigte Fettsäuren/Monoinsaturados/ Jednonienasycone/Μονοακόρεστα/ Mononenasýtené mastné kyseliny	1,9 g
- Mehrfach ungesättigte Fettsäuren/Polinsaturados/ Wielonienasycone/Πολυακόρεστα/ Polynenasýtené mastné kyseliny	0,87 g
– Arachidonsäure (AA)/Ácido Araquidónico/ Kwas arachidonowy (AA)/ Αραχιδονικό οξύ (ΑΑ)/ Kyselina arachidónová (AA)/ – Docosahexaensäure (DHA)/	25,6 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA)/ Εικοσιεξαένοϊκό οξύ (DHA)/ Kyselina dokosahexaénová (DHA)/	25,3 mg
Kohlenhydrate/Hidratos de carbono/ Węglowodany/Υδατάνθρακες/ Sacharidy (45 En%) davon/dos quais/w tym/ z nich/z toho	10,1 g
- Zucker/Açucares/Cukry/Ζάκχαρα	5,9 g
- Laktose/Lactose/Laktózy/ Λακτόζη/Laktóza	5,33 g
Ballaststoffe/Fibra/Błonnik/ Εδώδιμες Ίνες/Vláknina (1 En%)	0,59 g
2'-Fucosyllactose (2'FL)	
2'-fucosil-lactose (2'FL)/	
2'-fukozylolaktoza (2'FL)/	
2'Φουκοσυλλακτόζη (2'FL)/	
2'-fukosyllaktóza (2'FL)/	
- 2'-Fucosyllaktosa (2'FL)	20,0 mg
Eiweiß/Proteinas/Białko/Πρωτεΐνη/ Bielkoviny/Bielkoviny (10 En%)	2,6 g
Salz/Sal/Sól/Αλάτι/Soľ/Soľ	0,09 g
Vitamine/Vitaminas/Witaminy/ Βιταμίνες/Vitamíny/Vitamíny	
Vit. A/Vitamina A/Wit. A	88,0 µg
Vit. D/Vitamina D/Wit. D	2,40 µg
Vit. E/Vitamina E/ Wit. E (0,70 mg α-TE/ET)	2,52 mg
Vit. K/Vitamina K/Wit. K	6,70 µg
Thiamin/Tiamina/Witaminy/Θειαμίνη/Tiamín	0,15 mg
Riboflavin/Riboflavina/Ryboflawiny/ Ριβοφλαβίνη/Vitamín B2/Witaminy	0,20 mg
Niacin/Niacina/Niacyna/ Νιασίνη/Niacín/Niacín (1,51 mg NE/ΕΝ)	0,80 mg
Pantothensäure/Ácido pantoténico/ Kwas pantotenowy/Παντοθενικό Οξύ/ Kyselina pantoténová/ Κυσελίνα παντοθενικού/Kyselina pantoténová	0,80 mg
Vit. B6/Vitamina B6/Wit. B6	0,11 mg
Folsäure/Ácido fólico/Kwas folowy/ Φυλλικό Οξύ/Kyselina listová	16,0 µg
Folat/Folato/Folany/Φυλικό Οξύ/ Folát	26,7 µg
Vit. B12/Vitamina B12/Wit. B12	0,30 µg
Biotin/Biotina/Biotyna/Βιοτίνη/Biotín	4,00 µg
Vit. C/Vitamina C/Wit. C	14,0 mg
Mineralstoffe und Spurenelemente/ Minerais e Oligoelementos/ Składniki mineralne i pierwiastki śladowe/ Μέταλλα και ίχνοστοιχεία/ Minerálne látky a stopové prvky/ Minerálne látky a stopové prvky	
Na/Sód	35,6 mg
K/Potas	(2,86 mmol) 112 mg
Cl/Chlorek	(2,15 mmol) 76,2 mg
Ca/Wapń	(2,52 mmol) 101 mg
P/Fosfor	(1,64 mmol/POA) 50,9 mg
Mg/Magnez	(0,38 mmol) 9,14 mg
Fe/Żelazo	1,20 mg
Zn/Cynk	0,80 mg
Cu/Miedź	0,075 mg
Mn/Mangan	0,006 mg
Mo/Molibden	< 8,00 µg
Se/Selen	3,75 µg
Cr/Chrom	< 8,00 µg
I/Jód	19,0 µg
Weitere/Outros/Inne/Ιοντα/Ďalšie/Iné	
L-Carnitin/L-carnitina/L-karnityna/ L-Καρνιτίνη/L-karnitín/L-karnitín	2,00 mg
Cholin/Colina/Cholina/Χολίνη/ Cholín/Cholín	31,4 mg
Inositol/Inositol/Inozytol/Ινοσιτόλη/ Inozitol	25,0 mg
Taurin/Taurina/Tauryna/Ταυρίνη/ Taurín	7,00 mg
Nukleotide/Nucleotídeos/Nukleotydy/ Νουκλεοτίδια/ Nukleotidy	3,60 mg
Osmolarität/Osmolaridade/ Osmolarność/Ωσμωτικότητα/ Osmolarita	305 mOsmol/l

Hersteller/i vom: N.V. Nutricia, 2712 HM Zoetermeer, Niederlande.
Vertrieb durch: Danone Deutschland GmbH, Postfach 100359, 60003 Frankfurt, Deutschland • www.nutricia.de
Danone Österreich GmbH, Hallener Landesstr. 58, 5412 Puch bei Hallein, Österreich • www.nutricia.at
Danone Schweiz AG, Hardturmstr. 135, 8005 Zürich, Schweiz • www.nutricia.ch
Kontakt Nutricia Produktberatung D-A-CH: 00 800-700 500 00

Wyprodukowano przez: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandia.
Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Serwis Konsumencki: tel.: 22 55 00 155, e-mail: serwis@nutricianestle.com.pl • www.nutriciamedycyna.pl.
Παράγεται από: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Ολλανδία.
Numil Hellas A.E. - Περιβόητου, 17 γρ.Ιλίου Ελευτ. Οδού Αθηνών Λαυρίου, Β. Κολλεγιάτης 2 - 14564 Ν. Κηφισιά - Τηλ 210 6248500 - Γραμμή φροντίδας 8001169600 χωρίς χρέωση www.nutricia-medical.gr Αρ. Γ κωπ/παρασκ. ΕΟΦ 97388 /06-10-2014 ΠΟ προϊόν δεν υπάκειται σε διαδικασία αδειοδότησης
Výrobca: N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, Nizozemsko.
Kontakt pre ČR: Danone a.s., V jámu 2294/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, infolinka: 800 110 001, www.nutricia.cz.
Výrobca: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandsko
Kontakt pre SR: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov. Infolinka: 0800 444 006, www.nutricia.sk.

Mindestens haltbar bis: siehe Verpackungsseite. Lote nº/ Consumir de preferência antes de: ver lateral da embalagem.
Należ spożyć przed: na boku opakowania.
Ανάλωση έως: βλέπε στην πλευρά/ Najlepšie spotrebiť do: viz boční strana obalu.
Minimálna trvanlivosť do: pozrite bočnú stranu obalu.

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Zum Diätmanagement bei krankheitsbedingter Mangelernährung und Gedeihstörung. Gebrauchshinweise, energiereiche Trink- und Sondennahrung, geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Für Säuglinge und Kleinkinder von Geburt an bis zu 3 kg. Körpergewicht oder einem Alter von 18 Monaten mit Gedeihstörung, erhöhtem Energiebedarf und/oder Flüssigkeitsrestriktion. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Wichtige Hinweise: Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nicht zur parenteralen Ernährung. Verwendung unter ärztlicher Aufsicht, unter Berücksichtigung aller Ernährungsoptionen, inkl. Stillen. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Von Geburt bis 18 Monate oder bis 9 kg Körpergewicht für Säuglinge und Kleinkinder.
Empfohlene Tagesmenge: Sollte von einem Arzt festgelegt werden. **Gebrauchsanweisung:** Waschen Sie Ihre Hände, benutzen Sie sauberen Utensilien. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Verwendung füllen Sie die Nahrung in ein sterilisiertes Fläschchen, einen Becher oder einen für die Verabreichung von Sondennahrung geeigneten Behälter. Das Produkt kann erwärmt oder bei Zimmertemperatur verabreicht werden. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer die Temperatur. **Verwendung als Trinknahrung:** Beim Verzehr direkt aus der Flasche, Reste verwerfen. **Verwendung als Sondennahrung:** Das Produkt hat eine Haltezeit von max. 4 Stunden. Reste verwerfen.
Lagerung: Kühl und trocken lagern. Geöffnete Flasche verschließen und für max. 24 Stunden im Kühlschrank lagern.
Hinweis zur Zahngesundheit: Dauernuckeln vermeiden. Bitte achten Sie auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen.
Zutaten: Demineralisiertes Wasser, entrahmte **Kuh**milch, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Kokosnussöl (enthält Lecithine (aus **Soja**)), Rapsöl, mittelkettige Triglyceride (Kokosnuss- und Palmöl), Maisöl), **Lakt**ose (aus **Kuhmilch**), Galakto-Oligosaccharide (aus **Kuhmilch**), Molkeneiweiß (aus **Kuhmilch**), wasserfreies **Milch**fett, **Fisch**öl, Calciumcitrat, Fruktо-Oligosaccharide, Kaliumcitrat, Säureregulator (Citronensäure), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Cl aus Mortierella alpina, Calciumphosphat, Natriumchlorid, Cholinchlorid, Inositol, L-Ascorbinsäure, Calciumhydroxid, 2'-Fucosyllactose, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat, Kaliumhydroxid, Kaliumdihydrogenphosphat, Taurin, Eisensulfat, Natriumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Cyticlin-5'-monophosphat, L-Carnitin, Adenosin-5'-monophosphat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumsalze von Uridin-5'-phosphorsäure, Nicotinamid, Natriumsalze von Inosin-5'-phosphorsäure, Kupfergluconat, Natriumsalze von Guanosin-5'-phosphorsäure, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Kaliumiodid, Chromchlorid, Phenylmonoglutamidsäure, Mangansulfat, Phytomenadion, Natriummolybdat, D-Biotin, Natriumselenit, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.

Alimento para fins medicinais específicos. Para a gestão nutricional da malnutrição e dificuldades de crescimento. Dieta completa hipercalórica, pronta para tomar. Indicado para lactentes, desde o nascimento, e crianças até aos 18 meses de idade (ou 9 kg) com dificuldades de crescimento, aumento das necessidades energéticas e/ou restrição de fluidos. Embalado em atmosfera protetora.

Importante: Exclusivamente para uso entérico - não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser utilizado sob supervisão médica, após consideração de todas as opções de alimentação, incluindo o aleitamento materno. Adequado como fonte alimentar única desde o nascimento até aos 18 meses (ou 9 kg).

Quantidade recomendada: Deve ser determinada pelo médico ou nutricionista.
Modo de utilização: Lave as mãos e utilize utensílios limpos ou esterilizados. Agitar antes de utilizar. Coloque a quantidade recomendada num biberão esterilizado, recipiente de administração por sonda ou copo adaptado. O produto pode ser administrado à temperatura ambiente ou aquecido. Verifique sempre a temperatura antes de utilizar.
Para administração oral: Se for consumido diretamente da garrafa, rejeitar o excedente. Para administração por sonda: O tempo de administração do produto não deve exceder as 4 horas. Os alimentos preparados e não consumidos devem ser rejeitados. **Conservação:** Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz. Após abertura, fechar bem a garrafa e conservar qualquer resto de produto não utilizado no frigorífico, no máximo, durante 24 horas. Aviso - Saúde oral: A manutenção de uma higiene oral adequada é importante para lactentes e crianças, uma vez que o contacto prolongado ou frequente da fórmula com os dentes aumenta o risco de deterioração dos mesmos.
Ingredientes: água desmineralizada, **leite** de vaca desnatado, maltodextrina, óleos vegetais (girassol, coco (**soja**), colza, triglicéridos de cadeia média (coco e palma) e milho)], lactose (do **leite** de vaca), galacto-oligossacarídeos (do **leite** de vaca), frutooligossacarídeos, citrato de potássio, regulador de acidez (ácido cítrico), emulsionante (mono- e di-glicéridos de ácidos gordos), óleo de Mortierella alpina, fosfato de cálcio, cloreto de sódio, cloridrato de colina, inositol, ácido L-ascórbico, hidróxido de cálcio, 2'-fucosil-lactose, cloreto de potássio, carbonato de magnésio, hidróxido de potássio, hidrogenofosfato dipotássico, taurina, lactato ferroso, hidróxido de sódio, L-ascorbato de sódio, acetato de DL-α-tocoferilo, sulfato de zinco, ácido citidina-5'-monofosfórico, L-Carnitina, ácido adenosina-5'-fosfórico, D-pantotenato de cálcio, sais de sódio de uridina-5'-monofosfato, nicotinamida, sais sódicos de inosina 5'-monofosfato, gluconato cúprico, sais sódicos de inosina 5'-monofosfato, cloridrato de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, acetato de retinilo, iodeto de potássio, cloreto de crómio, ácido pteroilmonoglutâmico, sulfato de manganês, filoquinona, molibdato de sódio, D-biotina, selenito de sódio, colecalciferol, cianocobalamina.

PL Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą i zaburzeniach wzrastania. Initatini jest produktem o wartości energetycznej 1 kcal/ml, kompletnym pod względem odżywczym, gotowym do użycia. Dla niemowląt od urodzenia i małych dzieci do osiągnięcia 18. miesiąca życia lub 9 kg masy ciała.
Proponowane stosowanie: Musi być określone wyłącznie przez lekarza lub dietetyka. **Sposób użycia:** Umyć ręce. Używać wysterylizowanych naczyń. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Wlać produkt do wysterylizowanego naczynia: butelki, kubka lub zgodnie z zaleceniami przez zgłębnik. Można podawać produkt o temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu. Przed podaniem sprawdzić temperaturę produktu. **Stosowanie doustne:** Jeśli spożywano bezpośrednio z butelki, niewykorzystaną pozostałość wyrzucić. **Stosowanie przez zgłębnik:** Czas podawania produktu wynosi maksymalnie 4 godziny. Niewykorzystany pozostałość wyrzucić.
Najlepiej spożyć przed: na boku opakowania.
Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po pierwszym otwarciu opakowania niewykorzystaną część produktu przechowywać w zamkniętej butelce, w lodówce, maksymalnie do 24 godzin. **Ostrzeżenia dotyczące higieny zębów:** Ważna jest higiena jamy ustnej niemowlęcia i dziecka, gdyż przedłużający się lub zbyt częsty kontakt napojów lub pokarmów z zębami niemowlęcia/dziecka zwiększa ryzyko próchnicy. Należy umyć zęby niemowlęciu/dziecku po ostatnim wieczornym karmieniu. Należy zasięgnąć porady lekarza lub lekarza dentysty w sprawie higieny zębów niemowlęcia/dziecka.
Składniki: woda demineralizowana, odtłuszczone **mleko** krowie, maltodekstryna, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej kokosowy (zawiera lecytyny (lecytyna **sojowa**)), olej rzepakowy, średniołańcuchowe triglicerydy (olej kokosowy i olej palmowy), olej kukurydziany), laktoza (z **mleka** krowiego), galaktooligosacharydy (z **mleka** krowiego), fruktooligosacharydy, cytrynian potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych), olej z Mortierella alpina, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek choliny, inozytol, kwas L-askorbinowy, wodorotlenek wapnia, 2'-fukozylolaktoza, chlorek potasu, węglan magnezu, wodorotlenek potasu, wodorofosforan dipotasu, tauryna, mleczan żelaza(II), wodorotlenek sodu, L-askorbinian sodu, octan DL-alfa-tokoferylu, siarczan cynku, 5'-monofosforan cytydyny, L-karnityna, 5'-monofosforan adenozyny, D-pantotenian wapnia, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, nikotynamid, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, glukonian miedzi(II), sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, chlorek chromu(III), kwas pteroilomonoglutaminowy, siarczan manganu, fitomenadion, molibdenian(VI) sodu, D-biotyna, selenian(IV) sodu, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

GR Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Γι α τη διατητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) που σχετίζεται με ασθένεια και υποχρόνιμη ανάπτυξη. Υπερθερμιδική, διατροφικά πλήρες, έτοιμο προς χρήση. Για βρέφη από τη γέννηση και για μικρά παιδιά έως 18 μηνών (9 Κg) με υποκαταβολή ανάπτυξης, αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις και/ή περιορισμό υγρών. Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.
Σημαντική σημείωση: Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγηθεί/πρέπει υπό ιατρική επίβλεψη και μετά την έναρξη εξέτασης όλων των επιλογών διατροφής, συμπεριλαμβανομένου του θηλασμού. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής για βρέφη από την γέννηση και μικρά παιδιά έως 18 μηνών (9.5 kg).
Προτεινόμενη δοσολογία: Θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από ιατρό ή διαιτολόγο. **Οδηγίες χρήσης:** Πλύνετε τα χέρια σας, χρησιμοποιήστε καθαρά ή αποστειρωμένα σκεύη. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Τοποθετήστε την ποσότη σε αποστειρωμένο μπιμπερό, ποτήρι ή σε δοχείο εντερικού διαλύματος. Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί/δί σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεστό. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία πριν από τη χρήση. **Για άτομα από τα στόμα:** Εάν καταναλωθεί απευθείας από το μπουκάλι, απορρίψτε τα υπολείμματα.
Για άτομα μέσω καθετήρα: Αυτό το προϊόν πρέπει να χορηγηθεί σε διάστημα 4 ωρών. Να απορρίπτονται πάντα η ποσότητα προϊόν που έχει απομείνει.
Αποθήκευση: Να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μετά το άνοιγμα, αφήστε κάλι την συσκευασία και τοποθετήστε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο μπουκάλι για έως 24 ώρες.
Επισήμανση οδοντικής φροντίδας: Η καλή υγιεινή των δοντιών είναι σημαντική για τα βρέφη και τα παιδιά, καθώς η παρατεταμένη ή συχνή επαφή ροφημάτων και τροφίμων με τα δόντια αυξάνει τον κίνδυνο της φθοράς των δοντιών. Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια των παιδιών καθαρίζονται μετά το τελευταίο γεύμα. Συμβουλευθείτε τον ιατρό ή τον οδοντίατρο σας. **Συστατικά:** απιονισμένο νερό, αποβουτυρωμένο γάλα αγελάδος, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, έλαιο καρύδας (σόγια), καρυδέλαιο, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας έλαιο καρύδας και φοινικέλαιο), αραβοπιπέλαιο), λακτόζη (από αγελαδινό γάλα), γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (από αγελαδινό γάλα), ταυρικό άλας γάλακτος, ηλεκτρολύτες, ιατρικό αζάξιπτο, φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες, κιτρικό κάλιο, ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), γαλακτοματογλυκερίτης (μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων), έλαιο από Mortierella alpina, φωσφορικό ασβέστιο, γλυκερόλο νάτριο, γλυκονικός χαλκός, ινοσιτόλη, L-ασκορβικό οξύ, υδροξείδιο του ασβεστίου, 2-φουκοσυλλακτόζη, χλωριούχο κάλιο, ανθρακικό μαγνήσιο, υδροξείδιο του καλίου, όξινο φωσφορικό κάλιο, ταυρίνη, γαλακτικός σίδηρος, θειϊκός σίδηρος, υδροξείδιο του νατρίου, L-ασκορβικό νάτριο, 5'-μονοφωσφορική ουριδίνη, L-καρνιτίνη, 5'-μονοφωσφορική αδενοσίνη, D-πανοθενικό ασβέστιο, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής κυτιδίνης, νικοτιναμίδιο, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής ινοσίνης, γλυκονικός χαλκός, άλας νατρίου 5'-μονοφωσφορικής γουανοσίνης, υδροχλωρική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική πυριδοξίνη, οξικός ρετινύλιο, ιωδιούχο κάλιο, χλωριούχο χρώμιο, γλουταμινικό φαινυλικό, θειϊκό μαγγάνιο, φυτομεναδιόνη, μολυβδαινικό νάτριο, D-βιοτίνη, σελενικός νάτριο, χοληκαλσιφερόλη, κυανοκοβαλαμίνη.

Pro podávání sondou: Maximální doba zavádění této výživy jsou 4 hodiny. Nespotřebovanou porci vždy zlikvidujte. **Skladování:** Skladujte na suchém a chladném místě. Po otevření uchovávejte nepoužitou výživu v uzavřené lahvičce v chladničce max. po dobu 24 hodin.
Ochrana zdraví zoubků: Správná dentální hygiena je u kojenců a dětí důležitá, neboť dlouhodobá nebo pravidelná konzumace nápojů a výživy za použití savičky zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Ujistěte se, že po posledním denním krmení jsou zuby vyčištěny. V případě potřeby se informujte u svého zubního lékaře.
Složení: demineralizovaná voda, odtučněné kravské **mléko**, maltodextrin, rostlinné oleje (slunečnicový, kokosový (obsahuje **sóju**), řepkový, triglyceridy se středním řetězcem (kokosový a palmový olej), kukuřičný), laktóza (z kravského **mléka**), galaktooligosacharidy (z kravského **mléka**), synovětvová bílkovina (z kravského **mléka**), bezvodý **mléčný** tuk, rybí olej, citronan vápenatý, fruktooligosacharidy, citronan draselný, regulátor kyselosti (kyselina citronová), emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselin), olej z huby Mortierella alpina, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, cholin chlorid, inositol, kyselina L-askorbová, hydroxid vápenatý, 2'-fukosyllaktóza, chlorid draselný, uhličitan horečnatý, hydroxid draselný, hydrogenfosforečnan draselný, taurin, síran železnatý, hydroxid sodný, L-askorban sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinečnatý, cytidin 5'-monofosfát, L-karnitin, adenozin 5'-monofosfát, D-pantotenát vápenatý, sodná sůl uridin 5'-monofosfátu, nikotinamid, sodná sůl inozin 5'-monofosfátu, glukonan měďnatý, sodná sůl guanozin 5'-monofosfátu, tiamin hydrochlorid, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, retinylacetát, jodid draselný, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutamová, síran manganatý, fytomenadion, molybdenan sodný, D-biotin, seleničitan sodný, cholekalciferol, kyanokobalamin.

SK Patrovina na osobitné lekárske účely. Na parenterálnu výživu nie je vhodná. **Spôsob použitia:** Pred použitím dobre pretrepať. Naliate výživu do vysterilizovanej fľaštičky, pohárika alebo do nádoby na sondovú výživu. Výživu je možné podávať pri izbovej teplote alebo ohriatu. Vždy skontrolujte teplotu podávanej výživy. **Perorálne podávanie:** Ak je výživa podávaná priamo do úst z fľaše, nedopitú výživu vždy zlikvidujte. **Podávanie sondou:** Maximálna doba zavedenia tejto výživy sú 4 hodiny. Vždy zlikvidujte nedopitú výživu.
Skladovanie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Po otvorení uchovávajte nepoužitú výživu v uzavretej fľaštičke v chladničke max. po dobu 24 hodín.
Ochrana zdravia zubov: Správna dentálna hygiena je pre dojčatá a deti dôležitá, pretože dlhodobá alebo pravidelná konzumácia nápojov a výživy pri použití cumlíka zvyšuje riziko vzniku zubného kazu. Uistite sa, že po poslednom dennom kŕmení sú zuby vyčistené. V prípade potreby sa informujte u svojho zubného lekára. **Zloženie:** demineralizovaná voda, odtučnené kravské **mlieko**, maltodextrín, rastlinné oleje (slnečnicový, kokosový (obsahuje sójový), repkový, triglyceridy so stredne dlhým reťazcom (kokosový a palmový olej), kukuričný), laktóza (z kravského **mlieka**), galaktooligosacharidy (z kravského **mlieka**), syrovátkový bielkovinový koncentrát (z kravského **mlieka**), bezvodý **mliečny** tuk, rybí olej, citrónan vápenatý, fruktooligosacharidy, citrónan draselný, regulátor kyslosti (kyselina citrónová), emulgátor (mono- a diglyceridy mastných kyselín), olej z huby Mortierella alpina, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, cholín chlorid, inozitol, kyselina L-askorbová, hydroxid vápenatý, 2'-fukozyllaktóza, chlorid draselný, uhličitan horečnatý, hydroxid draselný, hydrogénfosforečnan draselný, taurín, železnatý síran, hydroxid sodný, L-askorban sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, síran zinočnatý, cytidín 5'-monofosfát, L-karnitín, adenozín 5'-monofosfát, D-pantoténát vápenatý, sodná soľ uridín 5'-monofosfátu, nikotínamid, sodná soľ inozín 5'-monofosfátu, glukonan meďnatý, sodná soľ guanozín 5'-monofosfátu, tiamínhydrochlorid, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, retinylacetát, jodid draselný, chlorid chromitý, kyselina pteroylmonoglutámová, síran mangánatý, fytomenadión, molybdénan sodný, D-biotín, seleničitan sodný, cholekalciferol, kyanokobalamín.

PT Alimento para fins medicinais específicos. Para a gestão nutricional da malnutrição e dificuldades de crescimento. Dieta completa hipercalórica, pronta para tomar. Indicado para lactentes, desde o nascimento, e crianças até aos 18 meses de idade (ou 9 kg) com dificuldades de crescimento, aumento das necessidades energéticas e/ou restrição de fluidos. Embalado em atmosfera protetora.

Importante: Exclusivamente para uso entérico - não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser utilizado sob supervisão médica, após consideração de todas as opções de alimentação, incluindo o aleitamento materno. Adequado como fonte alimentar única desde o nascimento até aos 18 meses (ou 9 kg).

Quantidade recomendada: Deve ser determinada pelo médico ou nutricionista.
Modo de utilização: Lave as mãos e utilize utensílios limpos ou esterilizados. Agitar antes de utilizar. Coloque a quantidade recomendada num biberão esterilizado, recipiente de administração por sonda ou copo adaptado. O produto pode ser administrado à temperatura ambiente ou aquecido. Verifique sempre a temperatura antes de utilizar.
Para administração oral: Se for consumido diretamente da garrafa, rejeitar o excedente. Para administração por sonda: O tempo de administração do produto não deve exceder as 4 horas. Os alimentos preparados e não consumidos devem ser rejeitados. **Conservação:** Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz. Após abertura, fechar bem a garrafa e conservar qualquer resto de produto não

24 x 125 ml = 3000 ml

10485726

NUTRICIA Infatrini

24 x 125 ml = 3000 ml

POSTPRINT: 5 mm

PREPRINT: 8/10 mm

ZTM016_Outer case_ 24x125ml_ v02

GLUE AREA

NO ARTWORK

NO TEXT AREA

POSTPRINT: 5 mm

PREPRINT: 8/10 mm

New Material No:	10485726	**CBU:**	DANONE TRADING MEDICAL B.V.		
Current Material No:	10462064	**Description:**	Nutricia Infatrini 24 x 125 ml Outercase DE | PT | PL | GR | CZ | SK | AT | CH		
Corporate Code:	693658				
SAP Code:	193658				
Printer:	TOP-THIMM OPAKOWANIA				
Cutterguide:	ZTM016_Outer case_24x125ml_v2				
2D:	10485726				
Consumer Unit:	N/A	**SGK No.: 403287576**	**Date:** 30-06-2023	**r2**	
Supply Point:	N/A				

PMS 268 C FLX

REPRESENTATION: Colours represented with a diagonal line have been modified to aid PDF approval.

FINAL ART

SGK
Kingsway North - Team Valley
Newcastle - NE11 0JH - UK
T +44 (0) 191 491 7777
www.sgkinc.com
SGK is a Matthews International Corporation